

11. — **Sima Mocquerysi** ANDRÉ.

Congo français : Benda (P. CHARLEUF leg.)

12. — **Monomorium fasciatum** n. sp. (Fig. 1 c-e). — ♀. Long. 1,8 mill. — Jaune roussâtre clair. Gastre un peu ocracé avec une large bande d'un brun foncé en travers. Bord des mandibules brunâtres, lisses et luisant. Quelques longs poils sur l'abdomen et la tête, plus rares sur le thorax. Pubescence du corps presque nulle, assez abondante sur les appendices.

Tête un cinquième plus longue que large, les côtés convexes, le bord postérieur légèrement échancré, au milieu avec les angles arrondis et rentrés. Yeux ovales, au tiers antérieur des côtés, de 18 à 20 facettes. Epistome à carènes mousses largement engagé entre les arêtes frontales. Mandibules lisses avec quelques points épars à bord externe très convexe dans le tiers distal, armées de 4 dents. Le scape atteint le bord occipital. Articles 2 à 8 du funicule un peu plus épais que longs, le 9^m plus court et bien moins épais que le suivant, lequel est un peu plus long que large au bout. La massue est un peu plus longue que le reste du funicule. Echancre du métanotum prononcée avec un large sillon transversal dont le fond est strié. Le promésotum forme une assez forte convexité. Epinotum légèrement plus long que la moitié du promésotum. Ses deux faces unies en une forte convexité. Pétiole un quart plus long que haut avec un pédicule antérieur, long comme environ la moitié de la longueur du nœud, armé d'une éminence mousse en dessous. Nœud conique, aussi haut que long, à sommet arrondi, aussi large que le postpétiole. Celui-ci sphérique, à peine plus large que long. Gastre assez large à base étroite.

Assez voisin de *M. Oscaris* FOR, mais les antennes plus longues et la tête plus ovale.

Kilimandjaro (par REICHENSBERGER).

13. — **Monomorium altinode** SANTS, v. **Bondroiti** n. var. (Fig. 1 f). — ♀. Long. 1,8 mm. — Jaune ambré. Tête et massue des antennes d'un jaune plus rougeâtre. Angles antérieurs et apex du gastre nuagés de brun. Lisse et luisant, avec quelques points pilifères sur la tête. De longs poils également dispersés sur le corps. Appendices seulement pubescents. Pubescence d'ailleurs très clairsemée sur la tête, presque nulle sur le corps.

Tête rectangulaire, les côtés à peine convexes comme chez *M. lene*, mais les yeux sont plus petits, plus courts que l'intervalle qui les sépare de la base des mandibules, avec 15 à 20 facettes, au tiers antérieur des côtés. Epistome fortement prolongé entre les arêtes frontales, les carènes, bien accentuées, atteignent le bord