

antérieur qu'elles marquent de deux petits saillies dentiformes. Mandibules de 3 à 4 dents, l'apicale deux à trois fois plus forte que les suivants. Le scape atteint presque le bord occipital, articles 2 à 8 du funicule à peine plus épais que longs, le 9^{me} bien plus étroit et plus court que le 10^{me}, lequel est aussi épais à l'extrémité distale que long, l'ensemble de la massue plus court plus court que le reste du funicule. Pronotum assez robuste, aussi large que les 4/5 de la largeur de la tête. Promésonotum assez convexe sur le profil comme chez *M. fasciatum*, l'épinotum a la face basale un peu plus longue et plus basse que chez *fasciatum*. Le pétiole est aussi haut que long, son pédicule antérieur est moins long que la moitié de la longueur du nœud. Celui-ci est conique, 1/3 plus haut que long, ses faces antérieures et postérieures droites et le sommet brèvement arrondi, aussi large que le postpétiole lequel est bien plus haut que long. Diffère du type de l'espèce par son nœud, a la base plus allongée et l'angle de l'épinotum beaucoup plus arrondi, pour le reste semblable.

Congo belge: Lukuga supérieur (dans une termitière) (D^r GÉRARD; reçu de M. BONDROIT).

14. — **Monomorium léne** n. sp. (Fig. 2 *g-h*). — ♀ Long. 1,2-2,2 mill. — Jaune roussâtre, extrémité du gastre un peu enfumée de brunâtre. Lisse et luisant. Quelques longs poils clairsemés sur le corps. Pubescence éparsée sur la tête et les appendices, manquant presque sur le reste du corps.

Tête de 1/4 à 1/3 plus longue que large, les côtés et le bord postérieur droits, les angles occipitaux arrondis, yeux assez grands d'environ 35 facettes au tiers antérieur. Epistome distinctement bicaréné avec le bord antérieur échancré au milieu. Le scape est distant d'environ son épaisseur du bord postérieur de la tête. Les articles 2 à 8 du funicule plus larges que longs, le 9^{me} un peu plus court et bien plus étroit que le suivant. La massue est aussi longue que le reste du funicule. Profil du thorax un peu convexe, la suture métanotale un peu imprimée. La face basale de l'épinotum moitié plus longue que la déclive, s'unissant l'une à l'autre par un angle arrondi. Le pétiole est presque aussi long que les deux cinquièmes de la longueur du thorax et son nœud aussi haut, que le thorax et un peu plus haut que long. Son pédicule antérieur est long comme les deux tiers du nœud et présente une petite dent dessous. Le nœud est lui-même conique avec un sommet arrondi un peu plus étroit que le postpétiole. Ce dernier est à peine plus large que long et bien plus haut que long. Gastre légèrement échancré à la base.

Sud Rhodésia : Salisbury (G. ARNOLD leg).