

cré au milieu. Le scape atteint le bord occipital, les articles 2 à 7 du funicule un peu plus larges que longs, le 8^{me} plutôt plus long qu'épais. Le 9^{me} un peu plus long qu'épais, presque moitié plus court et épais que le suivant, lequel est aussi épais que long. Thorax environ un tiers plus étroit que la tête. Promésonotum plus convexe en arrière et sur le même plan que l'épinotum dont la face basale est peu convexe et le double plus longue que la déclive. Pétiole aussi haut que long, son pédicule antérieur court comme le quart de la longueur du nœud. Celui-ci est conique et d'un quart plus haut que long. Ses faces antérieure et postérieure obliques et droites, le sommet brèvement arrondi est le double plus large que long et distinctement plus étroit que le post-pétiole. Ce dernier est le double plus haut que long et la moitié plus large que long. Le gastre est un peu échancré à la base.

Gabon : Samkita (F. FAURE) 1 ♂.

Voisin de *M. egens* FOR., que je ne connais pas en nature, mais d'après la description il aurait les antennes comme chez *M. destructor-gracillimum* avec les articles de la massue plus allongés, en outre le nœud est plus long que chez *gracillimum* tandis qu'il est plus haut chez *explorator*.

16. — **Monomorium (Lampromyrmex) Rosæ** n. sp. (Fig. 2 c-f). — ♂ Long. 1,8 mill. — Brun jaunâtre, appendices et pédoncule jaune brunâtre. Lisse et luisant. Pilosité clairsemée manquant sur le thorax. Pubescence rare sauf aux scapes.

Tête un tiers plus longue que large, les côtés parallèles, le bord postérieur droit avec les angles arrondis. Yeux médiocres au tiers antérieur des côtés de la tête. Le scape atteint le bord postérieur. Articles 2 à 7 du funicule un peu plus épais que longs. Le 8^{me} presque aussi long que le 9^{me} mais moins épais; le dernier aussi long que les trois précédents réunis. Epistome échancré au milieu de son bord antérieur avec deux faibles carènes divergentes. Mandibules lisses, étroites de 3 dents. Thorax étroit, étranglé au niveau de la suture mesoépinotale, des deux côtés de laquelle il forme, sur le profil, une convexité régulière. La face basale de l'épinotum est d'un quart environ plus longue que la déclive avec un angle très arrondi et effacé. Pétiole allongé à pédicule antérieur près de la moitié aussi long que le nœud, lequel est aussi long que haut, largement conique et assez bas. Postpétiole aussi haut que le pétiole et près du double plus large. Le gastre est tronqué devant.

Congo belge : D^r BEQUART (N° 36). (Musée du Congo Belge).