

Pétiole allongé, comme chez *Rogeri*, bien plus que chez *hamatum*, le dessous concave. Le postpétiole est plus long que chez *hamatum*; vus de dessus, les stigmates font hernie comme de petits tubercules latéraux.

♂. Long. 6,5 mm. (tête fléchie); couleur aussi claire que le ♀, mais la tête est comme le thorax. Angles postérieurs de la tête moins arrondis que chez *Rogeri*. Les antennes sont plus fortes, les mandibules finement striolées (finement ponctuées chez *Rogeri*). L'épinotum n'a pas de lamelle transversale et il est plus long que chez *Rogeri*. Le postpétiole est plutôt plus court.

Intermédiaire entre *E. Rogeri* et *E. hamatum*.

Bolivie : Rio Ivari (Lizer et Delétang leg.) 1 ♀, 2 ♂. Le ♀ est peut-être une ♀. Emery (*Boll. Soc. Ent. Ital.*, XXVI, 1894, p. 180) décrit un ♀ de *E. Rogeri* qui ressemble beaucoup à *E. ferox*, mais avec l'épinotum muni d'une lamelle transversale.

***Atta polita* Em. v. *Lizeri* n. var.**

♂ 8 mm. (tête fléchie). Rouge brunâtre clair. Mandibules et devant de la tête brun rouge. Partout luisante, la tête et le gastre très luisants. Lisse, avec des points très faibles et clairsemés. Devant de la tête, côtés du thorax et pattes plus ou moins chagrinés; quelques rides sur les joues et le bord de l'épistome. Base des mandibules fortement striée, avec de gros points. Pilosité clairsemée, assez courte. A part le funicule, pas de pubescence.

Tête large de 3,5 mm., longue, au niveau des lobes occipitaux, de 2,9 mm. Ceux-ci sont un peu moins arrondis que chez *A. laevigata* mais sont bien moins anguleux que chez *A. Vollenweideri* For. ♂. Épines frontales coniques obliquant en arrière, très divergentes et plus longues que chez *laevigata* moins que chez *Vollenweideri*, qui les a dirigées plus en avant. Les mésonotales sont réduites à de simples dents rétroversées. Les épines de l'épinotum comme chez *Vollenweideri* (fig. 1).

♂. 6,5 mm. Brun rouge, la base du gastre rouge brunâtre clair (comme aussi chez ♀), avec le bord des segments rembrunis. Les deux tiers postérieurs de la tête, les épines du thorax et le gastre sont encore lisses et luisants, le reste mat, très finement rugueux-réticulé. Les lobes occipitaux ont une petite dent, plus petite que chez les ♂ *Vollenweideri* de même taille, les épines pronotales également plus courtes mais un peu recourbées en avant, celles de l'épinotum plus horizontales. Chez ♂ *polita* de même taille toute la sculpture serait luisante d'après Emery.