

Pheidologeton diversus JESD. st. **draco** nov. st. — ♂ (ocellé). Long., 11-12 mill. Tête et thorax, rougeâtres ou brun rougeâtre; gastre, noir ou noir brunâtre. Tête, large de 3,8 à 4,4 mill., longue de 3,8 à 4 mill. Tout le tiers moyen de la tête, lisse et luisant; rarement quelques stries sur les côtés. Le quart postérieur strié ridé en travers, avec les intervalles réticulés et mats. Face occipitale mate, plus finement et obliquement striée, avec de gros points épars. Pronotum strié en travers. Mésonotum lisse. Scutellum très développé. Epines aussi longues que la face basale de l'épinotum. Les deux faces forment un losange transversalement réticulé stiolé. Sommet du pétiole échancré. Postpétiole double plus large que le pétiole à côtes acuminié. Pilosité des tibias comme chez *diversus*.

♂. long 9-10. Sculpture et forme comme chez le ♀ mais sans l'ocelle. Les yeux sont un peu plus grand que chez *diversus* de même taille, du reste semblable.

♀'. Jaune brunâtre, tête et scape à peine rembruni. Long. : 2,5 mill.

♀. Long. : 16-17 mill. Tête large de 3,8 mill., longue de 3,2 mill. Thorax large de 3 mill., long de 5 mill., largeur du gastre 4 à 4,2 mill. Couleur comme chez les ♂ foncés. Les rides sont un peu effacées de chaque côté des ocelles, elles sont longitudinales en avant et divergentes en arrière de celles-ci, pour devenir transversales vers le bord occipital. L'antenne réclinée atteint l'angle postérieur de la tête. Epines épinoles longues comme le quart de leur intervalle. Sommet du pétiole échancré. Postpétiole à peine d'un quart plus large que le pétiole, les angles moins développés que chez le ♂.

Tonkin : Hanoi, Yambai (DEMANGE et FOUQUET. Cochinchine : Mitho (BOUVARD). Annam : Hué (LE MOULT).

Voisin de la race *ficta* FOR., par sa taille, mais diffère par la sculpture et la couleur.

Pheidologeton varius nov. st. — ♂. Long. 15 mill. Tête rouge plus ou moins sombre; gastre brunâtre; bord antérieur de la tête et mandibules noire ou noir rougeâtre. Tête carrée (4.8×4.8 mill.) presque entièrement striée-ridée, seul un petit espace luisant et lisse sur le vertex. Les stries, longitudinales devant divergent à partir du vertex pour devenir presque transversales au bord postérieur. Elles sont beaucoup plus grossières chez les ♂ *affinis*, et leur intervalle réticulé. Elles s'arquent et se continuent à partir du quart postérieur avec les stries des côtés de la tête et laissent de gros points au centre du tourbillon qui est assez lisse. Les antennes reclinés atteignent presque l'angle postérieur