

Mésnotum strié sauf le milieu qui reste lisse et luisant, ainsi que l'écusson qui fait une forte saillie. Epines presque aussi longues que la face basale de l'épinotum. Pétiole fortement échancré au sommet. Postpétiole le double plus large que long, le côté acuminié. Pas d'ocelle.

♂♂ Long. 13-10 mill. Sculpture et forme comme chez le ♂. chez la ♀ la tête est légèrement plus longue.

♀. Long. 5 mill. L'espace lisse s'étend jusqu'au tourbillon qui res te ponctué. Le dos du proménosotum est lisse, le scutellum abaissé.

♀". Long. 2.5 mill. Jaune, le gastre légèrement rembruni. La tête est ovale, arrondie derrière les yeux. Le scape dépasse le bord postérieur d'un cinquième à un quart de sa longueur. Tête et thorax lisses, quelques longs poils sur ce dernier. Epinotum réticulé, les épines divergentes, aussi longues que la face basale et peu relevées.

♂. Long. 11 mill. Noir brunâtre, appendice roux brunâtre. Largeur de la tête 2.6 mill., du thorax 3 mill. Mésnotum couvert de grosses et courtes rides anastomosées avec les intervalles rugueux. Cochinchine. Saïgon (FOUQUET).

Par sa forme et sa grande taille cette espèce se rapproche de *C. diversus*, par sa sculpture et l'absence d'ocelle, l'aspect des ♀" elle voisine *C. affinis*.

**Pheidologeton petulens** nov. sp.— ♂ Long. 10 mill. Brun maron foncé ou brun noirâtre. Mandibules noires, reste des appendices brun roussâtre. Sculpture striée disposée comme chez *P. affinis*, mais plus fine, les intervalles plus réticulés et l'espace lisse du vertex plus grand, aire retrooculaire lisse avec de gros points allongés. Moitié postérieure du mésnotum et scutum luisants et assez lisses, le reste strié en travers Pilosité dressée abondante même aux tibias.

Tête allongée (3.5×3 mill.) échancrée derrière, mais moins profondément que chez *affinis*. Les côtés faiblement arquées, (plus que chez *affinis*) Sillon frontal complet plus imprimé à la place de l'ocelle médian qui manque. Epistome plat au centre, faiblement échancré au milieu du bord antérieur. Mandibules striées près du bord terminal, le reste lisse avec de gros points, armées de deux dents apicales, le reste tranchant ou vaguement denté. Le scape n'atteint pas tout à fait l'œil, lequel est au tiers antérieur des côtés, assez petit et convexe. Thorax comme chez *affinis*, écusson saillant, les épines courtes, comme la moitié de la longueur de la face basale. Sommet du pétiole entier, arrondi. Postpétiole un tiers plus large que long, moitié plus large que le pétiole. Les côtés assez caniques et mousses. Gastre aussi large que la tête.