

♂. Long. 9 mill. Tête longue de 2.5 mill. large de 2 mill. La partie lisse et luisante du vertex occupe environ le tiers moyen de la tête et en atteint les côtés. Le sillon frontal s'efface dans la partie lisse qui présente des points pilifères espacés. La face déclive de l'épinothum devient lisse et luisante. Les épines très courtes et fines relevées.

♀. Long. 5.3 mill. Tête longue de 2 mill., large de 1.5 mill. Occiput strié en arc et ponctué. Vertex lisse jusqu'au bord postérieur de la tête. Les stries des joues atteignent les yeux et ne dépassent que de peu devant les arêtes frontales. Le scutum n'est que très peu saillant. Les épines aussi longues que le tiers de leur intervalle. La couleur d'un brun plus jaunâtre, plus diluée sur le gastre et les appendices.

♀' Long. 2 mill. Tête et promésonotum brun jaunâtre. Base du gastre un peu rembruni. Epistome, mandibules et le reste roussâtre ou jaune un peu brunâtre. Tête lisse, tronquée derrière, presque aussi large que longue (plus large chez *affinis* ♀'). Le scape atteint juste le bord occipital. La face basale plus longue que la face déclive (plus courte chez *affinis*). Les épines un peu plus relevées.

♀ 15-16 mill. Couleur et pilosité du ♂. Tête longue de 3.2 mill. large de 3 mill. Thorax large de 2.6 mill., long de 4.5 mill. Largeur du gastre 4.1 mill. Stries de la tête disposées comme *affinis* ♀ mais bien plus fines sans espace lisse au vertex, mais une aire lisse, grossièrement ponctuée derrière les yeux comme chez le ♂. Le scape est un peu plus long. Mésonotum luisant, lisse au milieu avec de gros points et quelques rides devant. Epinothum et pédoncule comme chez *affinis*. Postpétiole lisse et luisant devant.

Laos : Muong Pek (VITALIS DE SALVAZA).

***Pheidologeton pullatus** nov. sp.— ♀ Long. 15-16 mill. Noire. Pattes et antennes brun maron. Ailes très obscures, noirâtres. Tête ridée en long devant les ocelles, en divergent à partir de ceux-ci pour devenir arquées vers l'occiput. La tête est lisse dessous, luisante avec de gros points derrière les yeux, fortement réticulée vers l'occiput. Dos du thorax lisse avec de gros points épars sans quelques rides vers le pronotum qui est strié sur les côtés et lisse au milieu. Dessus de l'épinothum et face postérieure des deux nœuds ridé strié en travers. Gastre lisse avec une très fine ponctuation éparse. Une pilosité dressée roussâtre assez courte et abondante partout. Tête carrée (3.3×3.3 mill) un peu plus large derrière. Epistome assez plat et lisse comme le milieu des mandibules. Le scape atteint le milieu de l'œil. Thorax large de 3 mill. Dents de l'épinothum moins longues que le quart de leur intervalle. Pétiole large, transversal, avec une faible échancrure