

que longues atteignent le tiers postérieur de la tête et limitent une gouttière contenant toute la longueur du scape. Les yeux sont au tiers antérieur et réunis à l'extrémité du scrobe par un impression allongée peu prononcée où se place le fumicule. L'épistome est lisse au milieu, rugueux et ridé sur les côtés, incliné en avant plus bas que la troncature de la tête, assez plat avec une petite saillie au milieu; le milieu du bord antérieur un peu échancré. Le bord postérieur bien distinct. Aire frontale large, courte, très bien imprimée. Mandibules lisses avec quelques courtes stries à la base. Le promésonotum forme sur les côtés une convexité arrondie. Sillon du mésonotum plus enfoncé que chez *Sharpi*. La face basale est droite sur le profil, non relevée devant le sillon métanotal. Les épines aussi longues que la moitié de cette face relevées et pointues. Le pétiole est inerme dessous avec un nœud squameux, le sommet échancré. Postpétiole environ aussi large que long, les côtés coniques acuminés. (Beaucoup plus gros et arrondi chez *Sharpi*.)

♂. Long. : 2,5 mill. Brun-jaunâtre plus ou moins clair. Tête un peu foncée. Pilosité dressée, espacée sur le corps et les appendices. Mésonotum, épinothum, pédoncule, base du gastre réticulés, mats. Joux grossièrement réticulées en long, les intervalles réticulés. Quelques stries le long du bord interne des arêtes frontales. Le reste lisse et luisant. Tête en ovale assez large, arrondie derrière les yeux jusqu'à l'articulation qui forme un bord tronqué. Les arêtes frontales dépassent de peu le milieu de la tête, leur intervalle un peu déprimé. L'aire frontale très allongée et bien marquée. Epistome convexe avec une petite saillie médiane. Yeux assez grands un peu en avant du milieu des côtés. Mandibules striées de 7 dents ou denticules. Pronotum convexe mésonotum relevé devant la suture antérieure qui est enfoncée. Epines relevées, courtes comme du quart au tiers de leur intervalle qui est concave. La face basale s'abaisse au quart antérieur dans le sillon métanotal. Les deux nœuds sont de longueux subégale. Le postpétiole aussi large, dans son tiers postérieur, que long avec les côtés anguleux et plus du double plus large que le pétiole.

Voisin de *Capellini* par la forme tronquée de la tête et de *Sharpi* par la sculpture et la pilosité.

Cochinchine : Dalat (BOUVARD).

Aphoenogaster (Deromyrmex) Feae EM. — Tonkin : Chopa (VITALIS DE SALAZA) ♂.

IV^{me} sous-famille DOLICHODERINÆ FOR.

Dodichoderus (Hypoelinea) brevis nov. sp. — ♂ Long. 2,8-3,5 mill. Noire. Mandibules et antennes rousses, le tiers externe