

du scape en partie rembruni, pattes jaune brunâtre clair. Devant de la tête submat, très finement ponctué strié en long; reste de la tête, pattes, face déclive de l'épinotum et abdomen luisant et lisse. Thorax très grossièrement ridé rugueux avec de grosses fossettes irrégulières et luisantes. Pubescence très fine et très clairsemée. De longs poils fins sur la tête et le thorax, plus courts sous la tête, sur le scape et les pattes, partout espacés.

Tête aussi large derrière les yeux que longue, presque la moitié plus étroite devant que son bord postérieur transversal. Les angles postérieurs très arrondis. Yeux assez grands, un peu convexes situés près du milieu des côtés de la tête. Epistome convexe avec une impression longitudinale du milieu au bord antérieur, lequel est transversal. Aire frontale à peine limitée, sillon frontal obsolète. Arêtes frontales un peu plus espacées derrière que longues. Mandibules mates, finement ponctuées avec de gros points espacés, armées d'une dizaine de dents. Le scape dépasse à peine le bord postérieur de la tête, les articles moyens du funicule à peine plus longs qu'épais. Thorax aussi court que la longueur de la tête et des mandibules réunies. Face supérieure du pronotum bordée, en trapèze arrondi, environ le double plus large que longue, le devant coupé à pic sur le cou, les épaules en angles d'environ 45°. Mésonotum un peu moins large que long, arrondi devant, peu convexe, sans impression médiane, incliné en arrière et ne dépassant pas le plan du pronotum. Tubérosité des stigmates bordant le sillon métanotal. Face basale de l'épinotum 1/5 plus longue que large, subbordée aussi longue et large que le mésonotum. Son tiers antérieur se relevant presque verticalement, puis les deux tiers suivants obliquant moins fortement donnent en arrière une arête arrondie, mais marquée qui surplombe la face déclive. Celle-ci régulièrement et fortement concave de haut en bas. Ecaïlle inclinée en avant, assez mince, le sommet arrondi de droite à gauche et presque tranchant. Gastre aussi long que le thorax et la moitié de la tête réunis. Pattes courtes, les cuisses postérieures n'atteignent que les 2/3 postérieurs du gastre.

Laos : Entre Ventiane et Luang Prabang (V. DE SALVAZA) quelques ♂.

**Dolichoderus (Hypoelinea) bituberculatus** MAYR. ♂ — Tonkin : Hanoi, Thaaï-Ha (DEMANGE), Cochinchine : Saigon (BOUARD).

**Dolichoderus (Hypoelinea) bituberculatus** MAYR. var. **émarginata** nov. var. — ♂. Long. 3,6-3,8 mill. Tête et thorax noir.

Gastre brun, mandibules et antennes roussâtres, pattes d'un jaune un peu brunâtre. Sillon médian du mésonotum peu distinct. L'écaïlle légèrement échancrée près du sommet (vue de derrière).