

Chez le type les pattes sont plus foncées que les antennes, l'écaille non échancrée, la taille un peu plus petite, le mésonotum plus distinctement silloné.

ROGER décrit sous le nom de *Dolichoderus sellaris* une variété voisine, mais beaucoup plus grande.

Laos : Muong Pak (VITALIS DE SALVAZA). Tonkin : Hanoi.

Dolichoderus (Hypoclinea) affinis EM. var. **nigricans** EM. —
Laos : Muang Pak (VITALIS DE SALVAZA).

Dolichoderus (Hypoclinea) affinis EM. var. **mus** nov. var. — ♀ Long. 4 4,6 mill. Noir. Bord des mandibules et tarsi roussâtres, funicule et reste des appendices brun maron. Abondamment couvert d'une pubescence grise bien plus riche que chez le type et la var. *nigricans*, des poils dressés sont aussi très abondants même sur les appendices. Mâle, gastre luisant sous la pubescence. Mandibules luisantes. La tête et le scape sont légèrement plus courts, l'écaille bien plus épaisse, surtout plus épaisse que chez *nigricans*. Pour le reste semblable au type.

Cochinchine : Dalah (BOUVARD 1917).

Dolichoderus (Hypoclinea) Moggridgei For. Var. **bicolor** nov. var. — ♀ Long. 3.6-3.8 mill. Rouge-jaunâtre, pattes jaunes gastre brun avec l'anus rouge. Tête et gastre luisant. Thorax submat, faiblement réticulé, le scape dépasse de près d'un quart le bord postérieur de la tête. Côtés de la tête convexe, le bord postérieur étroit. L'impression latérale du clypeus n'atteint pas les côtés de la tête. Thorax relativement allongé, le mésonotum et l'épinothorax étroits, l'angle formé sur le profil par le pronotum et le mésonotum très ouverts, relativement bas, le reste comme la description du type qui est plus petit et concolor.

Indes : Sikkim (4000 pied d'alt.), reçu de M. FOREL.

Cette espèce est voisine de *D. affinis* EM par la protuberance des stigmates placés près du milieu de la face déclive du mésonotum (plus en arrière chez *D. taprobanæ*) mais facile à distinguer par sa tête lisse et luisante. J'ai reçu de la même région une ♀ noire avec la base du gastre et les appendices bruns roussâtre, la tête luisante; je la nomme var. **lugubris**, nov. var., pour le reste comme la var. *bicolor*.

Dolichoderus (Hypoclinea) taprobanæ SM. var. **obscuripes** nov. var. — ♀ Long. 2.5-2.8 mill., tête, funicule et thorax, souvent aussi la base du gastre, variant du jaune-rouge au brun-rouge acajou. Mandibules, tarsi et gastre d'un jaune assez clair. Scape et pattes d'un brun-rougeâtre bien plus foncé que le corps.