

(C'est le contraire chez le var. *siamensis* FOR.). Tête et épinothum comme chez *siamensis*, le mésonothum moins anguleux. Appendices finement pileux, le reste comme chez le type.

♀. Long. 4.7 mill. Tête, thorax et pédicule rouge sombre, mandibules et gastre jaune-brunâtre, appendices bruns-noirâtres.

Laos : Muory Pek. (20 XII, dans un arbre, VITALIS DE SALVAZA.)

Dolichoderus (Hypoclinea) taprobanæ SM. v. **tonkina**, nov. v. ♀. Tête, thorax et pattes brun-foncé, gastre noir. Mandibules, antennes et tarsi roussâtres. Tête aussi étroite et aussi luisante que le var. *siamensis* FOR. Thorax moins fortement sculpté. Mésonothum peu impressionné en long, et moins convexe que *siamensis*. La face basale de l'épinothum presque lisse, du reste comme le type.

Tonkin : Yambai (FOUQUET).

Dolichoderus (Hypoclinea) laotius nov. sp. — ♀. Long. 5,5-6 mill. Noire, base du scape, premier et dernier articles du funicule, bord des mandibules, pattes de la 1^{re} paire, les deux tiers internes des cuisses et des tibias de 2^e et 3^e paires et leurs tarsi rouges ferrugineux. Mate. Le bout des mandibules, l'aire frontale, les pattes et le dessous du gastre assez luisants. Tête, gastre et pronothum très finement et densément ponctués granulés; reste du thorax ponctué-réticulé. Quelques poils dressés sous l'abdomen, qui est couvert d'une pubescence dorée disposée comme chez *D. Feae* EM., bien plus clairsemée ailleurs.

Tête presque aussi large que longue, les côtés très convexes (bien plus arrondis que chez *D. Feae*), le bord postérieur d'un quart plus large que celui de l'épistome. Les yeux, très peu convexes, ronds, sont plus petits que chez *Feae*. Arêtes frontales plus divergentes que chez cette espèce. Sillon frontal assez distinct jusqu'à l'ocelle. Aire frontale assez imprimée. Epistome comme chez *Feae*: Pronothum plat et bordé comme chez *Feae*, mais encore plus court, le mésonothum y est plus engagé. Celui-ci est plus haut sur le profil, sa face supérieure moins large, les bords plus mousses, le dessus à peine imprimé, moins que chez *Feae*. La face basale est encore beaucoup plus prolongée derrière et dépasse toute la face déclive et se termine par deux lobes déprimés obliquement tronqués, bien plus saillants que chez *Feae*, leur face supérieure inclinée en dedans suit, sur le profil, le plan de la face basale. Ecaille plus haute que chez *Feae*, bien plus mince, à bord supérieur transversal, un peu mousse, légèrement échancré. Gastre tronqué devant.

Laos : Muong-Nya et Luang-Prabang (VITALIS DE SALVAZA).