

petits que chez *Feae*, obliquement relevé en dehors, mais ne dépassant pas du tout la face déclive (chez *Feae* ces lobes conservent le même plan que le reste de la face basale). Ecaille moins épaisse que chez *Feae*, le sommet transversal est aminci, les faces antérieures et postérieures un peu convexes. Base du gaste tronquée avec les angles un peu convexes dessus et moins pubescents.

Se rapproche de *D. gibbifer* par la forme et la sculpture de la tête, de *laotius* par son promésothorax, mais distinct de tous par ses lobes épinoaux.

Tonkin : Hanoï (FOUQUET).

**Iridomyrmex (anceps) MAYR.** — Cochinchine : Dalah (BOUVARD) ♂.

**Iridomyrmex lævigatus** EM. var. — ♀ La tête est peu ou pas échancrée derrière, plus large que longue chez les grandes ♀ de 3 mill., voisine de *Jactans*, mais plus petite.

Cochinchine : Saïgon (FOUQUET).

**Bothrimyrmex (Chronoxenus) Wroughtoni** FOR. v. *victoriae* FOR. ♀ ♀. — Tonkin : Hanoï (FOUQUET).

**Tapinoma indicum** FOR. — Tonkin : Hanoï (FOUQUET).

**Tapinoma melanocephalum** F. — Tonkin : Yambai (FOUQUET), Cochinchine : Mitho (BOUVARD).

**Technomyrmex albipes** SM. — Tonkin : Hanoï (DEMANGE), Yambai (FOUQUET), Haabinh (VITALIS DE SALVAZA). Cochinchine : Saïgon (FOUQUET).

#### Cinquième sous-famille. CAMPONOTINÆ FOR.

**Plogiolepis (Anoplolepis) longipes** JERD. ♂ ♀. — Tonkin : Haabinh, Dop. Fam. (VITALIS DE SALVAZA).

**Plagiolepis (Anacantholepis) Rothneyi** FOR. st. **Watsoni** FOR. ♂ — Tonkin : Chapa (VITALIS DE SALVAZA).

**Plagiolepis (Anacantholepis) Demangei** nov. sp. — ♀. Long. : 3-4 mill. Brun-rouge, le gaste un peu plus foncé. Mandibules, antennes, tibias et tarses roussâtre clair. Luisante, lisse et faiblement chagrinée. La base du gaste moins luisante, un peu reticulée. Pilosité dressée de longueur inégale assez abondante partout, plus clairsemée sur les appendices, plus dense sous la tête et sur les jones. Pubescence assez longue, claire, assez fournie (en général