

♂ " Les côtés du thorax sont d'un jaune terne (pas roussâtre) le dessus de la tête et du thorax un peu moins foncé que chez la " ♂.

♀. Long : 12 mill. Les côtés du thorax sont aussi foncés que le dos (plus clairs chez *fuscithorax* FOR.). La tête est plus longue, les côtés moins convexes et moins chargés derrière les yeux, plus parallèles (3 × 2,4 mill.). Le scape, long de 2.5 mill., dépasse d'environ un tiers le bord postérieur de la tête. Pilosité et le reste comme chez *fuscithorax*.

Laos : Luang-Prabang (VITALIS DE SALVAZA).

Camponotus (Myrmotuba) irritans SM. st. **procax** SANTS. (*Bull. soc. Vaud.*, S. N., vol. 52, 1919, p. 335. — Cochinchine : Mitho (BOUVARD).

Camponotus (Myrmotuba) nicobarensis MAYR. — Tonkin : Hué, Lat Ham, Hanoï (VITALIS DE SALVAZA et FOUQUET) ♀♀.

Camponotus (Myrmotuba) nicobarensis MAYR. v. **monticola** EM. ♂. — Tonkin : Haobinh, Muong-Nga (VITALIS DE SALVAZA).

Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus JERD. var. **paria** EM. ♀. — Tonkin : Chape, Ventiane (VITALIS DE SALVAZA).

Camponotus (Myrmosericus) dolendus FOR. ♂. — Tonkin : Hanoï. Laos : Thatom (VITALIS DE SALVAZA).

Camponotus (Myrmosphinta) camelinus SM. v. **singularis** SM. — Laos : Luang-Prabang (VITALIS DE SALVAZA).

Camponotus (Myrmosphincta) auriventris EM. — Cochinchine : Dalat (BOUVARD) " ♂ ♂ ".

Camponotus (Colobopsis) pubens MAYR. — Tonkin : Chapa ♀ (VITALIS DE SALVAZA). Yambay (FOUQUET). Hanoï (DEMANGE). — Cochinchine : Saïgon (FOUQUET).

Camponotus (Colobopsis) branchicephala SANTS. — Cochinchine : Saïgon (FOUQUET) ♂.

Espèce jaunâtre à tête beaucoup plus courte que longue.

Camponotus (Colobopsis) pyloros SANTS. — Cochinchine : Saïgon (FOUQUET). Forme voisine du *truncatus* SPIN.

Polyrhachis bihamata DRURY. — Laos : Luang Prabang. — Muang Sai. (VITALIS DE SALVAZA).

Polyrhachis (Camponyrma) Halidayi EM. — Laos : Luang Prabang, Tong-la (VITALIS DE SALVAZA).