

son tiers basal. Thorax un peu moins convexe que chez *mucronata*, le pronotum n'est pas épaulé mais arrondi et inerme. Il est presque aussi large que long avec le cou. La suture promésotale assez distincte mais nullement imprimée. Suture métanotale obsolète, indiquée par une légère dépression transversale allant de la base d'une épine à l'autre. Celles-ci sont droites, horizontales, divergentes et assez minces à leur base et aussi longues que l'intervalle de leur pointe et à peu près la moitié de la distance qui sépare leur base du bord antérieur du pronotum. Face déclive presque droite, avec les stigmates qui pointent à peine au-dessous du milieu de leur hauteur. Les deux épines de l'écaïlle sont plus courtes et bien plus divergentes que les précédentes de façon à ce que l'écartement de leur extrémité soit à peu près égal pour les deux paires. Elles sont plus relevées sur le profil que chez *mucronata* et *atrovirens*. Leur intervalle droit sans saillie. Vue de côté l'écaïlle a une face antérieure verticale presque droite, une face postérieure fortement oblique en avant et un peu convexe de façon que le sommet est très aminci et se confond avec la base des épines.

Voisine de *P. mucronata* SM, *atrovires* SM, *paromalus*, *hippomans* SM et *oedacantha* WHEEL.

Laos : Entre Luang Prabang et Vintiliame. (VITALIS DE SALVAZA).

Polyrhachis (Myrmopla) dives SM. — Tonkin : Chapa (VITALIS DE SALVOZA). Yambai (FOUQUET).

Polyrhachis (Myrmopla) armata LE GUIL. — Saïgon : FOUQUET.

Var. **minor** FOR. — Tonkin : Haabinh (VITALIS DE SALVAZA) Hanoi (DEMANGE).

Il reste un certain nombre de ♂ et ♀ indéterminables sans les ♀.

