

et luisants, avec quelques points. Les angles et les côtes derrière les yeux assez lisses. Les joues et les fosses antennaires fortement striées réticulées. Thorax irrégulièrement réticulé, plutôt faiblement réticulé au milieu du dos, submat. Col du pronotum, épinothum et côtés du pédoncule réticulés ponctués. Appendicès et reste de l'abdomen luisants et lisses. Pilosité moyenne. Tête déprimée, avec une impression transversale au milieu, plus longue que large, comme chez *biskrensis*. Le scape est distant de deux fois son épaisseur du bord postérieur. Thorax moins distinctement bordé que chez *semilæve*. Impression métanotale faible. Pétiote d'un tiers plus étroite que la postpétiote.

♀ Long. 4,2 mm. Couleur de l'ouvrière un peu plus fortement striée, mais moins fortement que chez *biskrensis*, et sans les gros points de *semilæve*. Mésonotum strié avec les bords lisses et luisants. Côtés du thorax plus finement striés que le front. Milieu du scutellum lisse. Face basale de l'épinothum, ses côtés et ceux du pédoncule très finement réticulés ponctués et peu luisants. Reste de l'abdomen luisant. Tête un peu plus étroite que chez *biskrensis*; les yeux presque aussi grands que le tiers du côté, sont placés en avant du milieu. Le scape atteint le quart postérieur de la tête. Premier article de la massue un peu plus long qu'épais. Epistome non caréné, mais la ride médiane plus grosse que les autres. Thorax à peine plus large que la tête. Le devant du promésonotum descend verticalement sur le pronotum. Profil dorsal rectiligne. Les deux faces épinothales subégales, fortement dentées. Pétiote un peu plus large que la moitié du postpétiote; le sommet faiblement échancré. Gastre assez allongé.

#### Angora.

L'♀ ressemble à celle de *semilæve* André, var. *Ernesti*; mais la tête est plus étroite ou les stries mieux indiquées. A *T. cæspitum* L. st. *biskrensis* For. se rattachent comme variétés les formes suivantes: *debilis* Em., *brevicornis* Em., *arxomboma* Karaw., *Kahena* Sants. et *galatica* Sants., qui se caractérisent par leurs petites femelles.

#### **Strongylognathus Kervillei** n. sp.

♀ Long. 2,8-3 mm. Jaune. Front, mandibules, antennes et gastre, d'un jaune légèrement roussâtre; un léger nuage brunâtre sur le milieu de ce dernier. Pilosité comme chez *Huberi* For. Lisse et luisant. Côtés de l'épinothum réticulés et submats.

Tête rectangulaire, un peu plus longue que large (un peu plus