

**Acantholepis Frauenfeldi** Mayr, v. *libanica* n. v.

♀ Long. 2,5 - 3 mm. Noire ou d'un noir brunâtre; mésonotum et appendices d'un roux plus ou moins brunâtre; le milieu des cuisses et des tibias plus obscurs. Mate, gastre luisant; dessus de la tête, assez luisant. Densément et microscopiquement ponctuée, les parties luisantes lisses, avec de fines réticulations. Pilosité dressée et pubescence presque aussi développée que chez *A. pubens* For.

Tête un peu plus longue que chez *Frauenfeldi*; le bord postérieur plus étroit, plus régulièrement arrondi derrière les yeux (sans les angles qui sont assez indiqués chez *Frauenfeldi*). Les yeux aussi grands, mais moins convexes. Epistome fortement caréné. Le scape dépasse de près de deux tiers le bord occipital. Thorax plus long et plus svelte que chez *A. Frauenfeldi* type. Tubercules épinoaux brièvement dentés. Ecaille ovale, à sommet échancré et bidenté mais plus étroitement que chez *bipartita* Em.

Syrie: Liban: Broumana.

Plus mate que la var. *siriaca* André.

**Lasius niger** L. st. *turcica* n. st.

♀ Long. 2,5 - 3 mm. Thorax brun jaunâtre, tête rembrunie, gastre brun, appendices jaune brunâtre et côtés du gastre luisants. Pilosité dressée, longue, comme la moitié du diamètre de l'œil; abondante sur le corps, ordinairement présente sur les joues, manquant sur les tibias et le scape, qui sont pubescents. Tête aussi large que longue. Le bord postérieur et les côtés, jusqu'au cinquième antérieur droits. Un sillon frontal bien distinct. Le scape dépasse de près d'un quart de sa longueur le bord postérieur de la tête. (Plus court chez *brunneus*.) Les yeux sont bien plus grands que l'espace qui les sépare du bord occipital. Thorax et écaille comme chez *brunneus*.

♀ Long. 7,5 - 8 mm. D'un jauné roux brunâtre; appendices et dessous du corps plus clairs. Les ailes sont entièrement et fortement enfumées, avec les nervures brun foncé (l'antérieure longue de 8,2 mm.) Pilosité dressée, un peu moins abondante que chez l'♀. Pubescence longue, bien fournie. Tête trapézoïdale, plus large que longue, bien plus étroite que le thorax. Sillon frontal atteignant l'ocelle. Mandibules de six dents aiguës. Epistome caréné. Aire frontale lisse. Les yeux très convexes. Le scape dépasse de près de la moitié de sa longueur le bord postérieur de la tête. Mésonotum plus large que long. Ecaille ovale, un peu échancrée au sommet. Palpes longs.