

large que l'épinotum. Postpétiole et article suivant plus d'un tiers plus large que long.

Dahomey : Porto Novo (Le Moul).)

✓✓ **Ponera Grandidieri** nov. sp. (Fig. 1 *d-e-f*).—♀ Long. 2.5 mill. Jauné roussâtre, appendices jaunâtres plus clairs. Luisante, la tête un peu moins que le corps avec une fine ponctuation. Pubescence assez abondante. Pilosité dressée vers la bouche et le gastre.

Tête un cinquième plus longue que large, les côtes convexes et rétrécis devant. Yeux d'une ou deux facettes au sixième antérieur des côtés. Le sillon frontal atteint le bord occipital et partage les lobes frontaux qui sont arrondis. Epistome assez long, à bord antérieur sinueux, avec une forte carène tranchante et convexe. Mandibules lisses de 7 dents, les apicales plus fortes. Le scape n'atteint pas tout à fait le bord postérieur. Promésonotum convexe, à suture distincte et séparé de l'épinotum par un sillon. Face basale de l'épinotum aussi courte que la déclive, cette dernière lisse, plane et à bords mousses. Ecaille le double plus haute qu'épaisse. Postpétiole plus long que large.

Madagascar: Grandidier 1893 (Museum de Paris) et ma collection.

J'ai confondu autrefois cette espèce avec *P. Johannæ* FOR. qui a l'épinotum encore plus convexe. Diffère des *P. Jugata* FOR., *glabrata* FOR. et *indifferens* FOR. par le fort sillon métanotal.

✓✓ **Euponera (Brachyponera) sennaarensis** MAYR. var. **decolor** nov. var.—♀ Long. 4-4.5 mill.—Moins robuste que le type. D'un roux brunâtre clair, l'épinotum et le dessus de l'écaille rembrunis. Les pattes plus jaunâtres. La tête est un peu plus étroite et les yeux plus petits. L'angle de l'épinotum est plus arrondi ainsi que sa face basale. Pour le reste comme chez le type.

Congo français : Minduli (A. WEISS).

Je pense pouvoir rapporter sous le nom de var. *Sorghi* ROY, des exemplaires de *E. sennaarensis* MAYR. un peu plus grands que le type, entièrement noirs avec les cuisses d'un brun foncé (plus claires chez le type). La pubescence est plus rare et l'insecte beaucoup plus luisant. Les dents des mandibules sont très irrégulières, parfois très mousses ou forment un bord simplement festonné, ou parfois très aiguës, seules les apicales sont toujours longues et fortes.

Sénégal : Ferlo (CLAVEAU).

Dorylus (Anomma) Kohli WASM. — ♂ (non décrit). Long. 10 mill. Tête large de 2.5 mill., longue de 2.7 mill. Couleur comme chez la var. *concolensis* SANTS, mais la sculpture est un peu plus