

mate. La forme de la tête est comme chez la var. *minor* SANTS, mais moins mate, moins fortement ponctuée et plus claire. Le pétiole est aussi large, ou plutôt légèrement plus large derrière que long.

Congo belge : Stanleyville, station St-Gabriel (Kohl), reçu de M. Wasmann. (Même station que les exemplaires types de Wasmann).

Dorylus (Anomma) Kohli Wasm. var. *victoriæ* nov. var. — ♀. Long. 8 mill. Diffère du type par sa couleur généralement d'un roux brunâtre clair. Les joues, le pétiole et le postpétiole ainsi que les appendices plus jaunâtres. Bien plus luisant que *D. Kohli*, mais moins que chez *D. Gerstaeckeri*. La tête est plus courte que chez *Kohli* et plus longue que chez *Gerstaeckeri* Em: Le pétiole est aussi long que large, ses côtés encore plus parallèles que chez *Kohli*.

Lac Victoria : Biloba (J. Carl.), reçu de M. Forel.

Dorylus (Anomma) Barmeisteri Shuck. v. *pallida* Sants. Uganda : Entebe (Forel leg.)

Pheidole dea nov. sp. — ♀ Long. 3.8-4 mill. — Noir; mandibules, extrémité des appendices bruns. ~~Epistome~~ Front, le gastre moins sa base et les appendices luisants et assez lisses. Le reste réticulé-ponctué et mat excepté le dessous du pronotum qui est assez luisant. Quelques rides longitudinales s'étendent de l'épistome à la hauteur des yeux. Une pubescence médiocre assez oblique sur les appendices, le corps est plutôt glabre.

Tête aussi large que longue, arrondie derrière les yeux qui sont au milieu des côtés. En avant de ceux-là, les côtés sont convergents. Pas de sillon frontal. Aire frontale grande et fortement imprimée. Épistome assez convexe avec une impression transversale au tiers antérieur qui relève le bord antérieur. Celui-ci n'a qu'une petite échancrure médiane. Mandibules striées le long du bord externe et à la base. Le scape dépasse de la moitié de sa longueur le bord postérieur de la tête. Les articles moyens du funicule sont environ le double plus longs qu'épais. Le promésonotum montre sur le profil quatre éminences successives. Pronotum piriforme, un quart plus long que large dans son tiers postérieur dont le bord supérieur est indiqué par deux tubercules. Un fort sillon promésonotal aussi imprimé que le sillon mésoépinal. Le mésonotum a une impression transversale au tiers postérieur et les deux tiers antérieurs occupés par deux tubercules qui séparent un léger sillon médian. La face basale de l'épinothorax trapézoïdale bien plus longue que large, faiblement concave de droite à gauche et subbordée. Face déclive aussi longue que la basale. Epines aussi longues que la face