

basale et le double plus longues que l'intervalle de leur base, relevées, arquées arrière, très aiguës et très divergentes. Pédicule du pétiole cylindrique suivi d'un nœud bas et faiblement échancré. Postpétiole globuleux aussi large que long, deux et demi fois plus large que pétiole et intermédiaire comme dimensions entre les *Pheidole crassinoda* EM. et *sculpturata* MAYR.

Congo belge : Lugombe (GÉRARD) 2 ♀.

Se rapproche beaucoup de *Ph. pulchella* SANTS, mais celle-ci est d'une autre couleur et les saillies thoraciques moins accentuées.

**Pheidole Berthoudi** FOR. var. **particeps** nov. var. — ♀ Long. 3.2-3.5 mill. — Brun noirâtre, les appendices d'un brun plus clair. Mate sauf la moitié ou les deux tiers postérieurs de l'abdomen qui sont lisses. La tête a, outre la sculpture ponctuée fondamentale de *Ph. Berthoudi*, de nombreuses rides longitudinales, très nettes sur l'épistome comme chez la race *welgelegensis* FOR. Le thorax est aussi fortement sculpté que chez cette forme. La tête rectangulaire, assez allongée, le scape la dépasse du cinquième au quart de leur longueur. Bosses du pronotum distinctes. Une pilosité fine et longue sur les appendices encore plus longue sur l'abdomen.

Afrique Orientale allemande : Bezirk, Bukoba (VIEHMEYER leg.) ♀  
Congo : Nyanza (GÉRARD) ♀ ♂. Les ♀ de cette localité sont un peu dimorphes, les ♂ se rapprochent de *Weissi* SANTS, mais sont bien plus pileuses. Le ♂ est aussi fort voisin de *Weissi*, mais les mandibules sont noires, la tête un peu moins mate et ses côtés plus rectilignes.

**Pheidole excelens** MAYR. v. **fulvobasalis** nov. var. — ♂. Diffère du type dont tout l'abdomen est brun foncé par le 1<sup>er</sup> article du gastre dont la base ou le tout est d'un fauve plus ou moins clair. Les mandibules noires ou noir-rougâtre et sans stries dans leur tiers médian. Les derniers segments du gastre luisants.

Dahomay : Agouagou (ROUBAUD) 1 ♂. — Congo français : Boda (CHARLEUF) 1 ♂; Guinée : Kindue (SILVESTRI) 1 ♂, 1 ♀.

**Crematogaster (Sphoerocrema) phoenix** nov. sp. — ♂ Long. 3.5-3.8 mill. — Noire, derniers tarse et bout de l'antenne d'un brun roussâtre. Tête mate, densément et finement striée en long sauf la face occipitale qui l'est en travers. Une ponctuation plus fine et plus espacée que chez *Cr. foraminiceps* se disperse sur la moitié postérieure de la tête. Dos du thorax fortement strié en long. La ride médiane qui prolonge la carène est plus forte sur le pronotum où les rides sont presque parallèles, beaucoup moins divergentes que sur la face basale de l'épinothorax. Les interrises sont