

assez larges et luisantes et presque lisses sauf chez la "♂ où elles deviennent réticulées sur le mésonotum. Côté du pronotum moins finement strié que la tête; mésopleure réticulé-punctué. Faces déclives du pronotum et de l'épinotum, pédoncule très faiblement sculpté, gastre chagriné, luisant. Pilosité dressée fine, moyennement abondante sur le corps manquant sur les appendices qui sont plus copieusement pubescents.

La tête est plus large que longue chez la "♂ et un peu plus longue que large chez la ♀". Les côtés sont assez convexes, le bord postérieur assez droit avec les angles arrondis. Les yeux occupent tout le deuxième quart postérieur de la tête et même s'étendent un peu en avant. Le sillon frontal atteint le quart postérieur ou l'ocelle quand il existe. Aire frontale peu distincte. Epistome sans carène, peu convexe, le bord antérieur faiblement arqué. Mandibules striées armées de 4 dents. Le scape atteint le bord postérieur de la tête chez la "♂ et le dépasse légèrement chez la ♀". Articles 4 à 7 du funicule aussi larges que longs, les précédents un peu plus longs. Forme générale du thorax comme chez *Cr. castanea* SUR. Le pronotum bordé, plat dessus en disque le double plus large que long. Le mésonotum est plus élevé avec une carène médiane devant et une face déclive en pente très douce, longue comme moins du quart de la face basale, plane et non bordée. Suture promésonotale indiquée sur le profil par une encoche. Sillon métanotal assez profond. Face basale de l'épinotum environ le double plus large que longue, un peu convexe, passant par une courbe à la face déclive plus longue. Epines épaisses à leur base, un peu recourbées en bas, faiblement relevées sur le plan épinal, un peu plus longues que la moitié de leur intervalle basal. Le disque du pétiole forme un ovale transversal plus long chez la "♂. Vu de dessus le postpétiole est presque carré, moitié plus étroit que le pétiole chez la "♂. Seulement un plus étroit chez la ♀" avec une petite dent dessous. Gastre tronqué.

Afrique orientale allemande, Bezirk, Bukoba (VIEHMEYER lög.) Cette fourmi se rapproche de *Cr. nigricans* FOR. (= *Cr. foraminiceps* SANTS st. *nigricans* FOR.), mais cette dernière, qui doit être une *Sphaerocrema*, avait la sculpture comme chez *foraminiceps* SANTS, c'est-à-dire plus faible, plus irrégulièrement ridée, les yeux plus avancés. *Cr. phœnix* en est peut-être une simple sous-espèce.

**Crematogaster (Acrocoelia) Viehmeyeri** nov. sp. —  
 ♀ Long. 3.2-3.5 mill. — Brun jaunâtre, joues plus claires, reste de la tête, appendices et gastre d'un brun de poix plus foncé. Devant de la tête et dessus du thorax très finement et irrégulièrement striolé en long et assez luisant, le reste lisse avec quelques gros