

points sur la tête. Quelques grands poils vers la bouche, une paire sur le pronotum, une autre sur le pétiole et les autres clairsemés sur le bout du gastre. Pubescence très courte sur la tête, les appendices, plus longue sur l'abdomen.

Tête aussi longue que large, le milieu du bord postérieur droit ou faiblement concave et les angles fortement arrondis. Les yeux un peu convexes occupent le cinquième médian des côtés. Le sillon frontal atteint le vertex. Aire frontale peu distincte. Epistome non caréné à bord antérieur faiblement convexe. Mandibules striées de 4 dents. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 7 du funicule aussi longs que larges. Côtés du pronotum arrondis et bordés, le dessus, assez plan, passe à la face déclive par une courbe. Mésonotum bordé dans sa moitié postérieure qui est transversalement concave et fortement convexe d'avant en arrière. Le sillon métanotal n'est pas très profond et la face basale de l'épinotum se trouve sur un plan à peine inférieur de celui du pro-mésonotum. En outre une impression transversale au devant de la face basale et presque aussi forte que le sillon métanotal indique un métanotum plat trois à quatre fois plus large que long. Face basale un peu convexe avec une impression longitudinale au milieu. La face déclive forme avec la précédente un angle très ouvert et est plus de deux fois plus longue. Les épines obliques en haut et en dehors, un peu recourbées en arrière, à base large, sont aussi longues que la moitié de l'intervalle de leur base. Stigmates très grands, le disque du postpétiole est en ovale transversal, à côtés faiblement relevés. Sillon du postpétiole fortement imprimé, surtout en arrière. Gastre largement tronqué.

Afrique orientale allemande (VIEHMEYER leg. 2 ♀).

Crematogaster (Decacrema) solenopsoides EM. st. **flavida** MAYR. var. **poststriata** nov. var. — ♂ Long. 2.3 mill. — Couleur et forme comme chez *flavida*, dont la nouvelle variété diffère par les fortes stries longitudinales de la face basale de l'épinotum.

Afrique orientale allemande (VIEHMEYER leg.)

Crematogaster (Atopogyne) africana MAYR. st. **thoracica** nov. st. — ♀ Long. 3-3.7 mill. — Noir. Thorax rouge sombre ou brun rouge foncé. Mandibules et côtés de l'épistome, milieu du funicule et tarsi d'un roux plus ou moins brunâtre. Assez luisante, plus que chez la var. *Schumanni* MAYR, mais moins que chez *Cr. laurenti* FOR., les stries de la tête bien plus faibles que chez *africana* type. Pilosité rare. Tête un peu plus longue que large, un peu plus étroite au bord postérieur qui n'est pas échancré. Côtés