

peu convexes. Sillon frontal très imprimé. Pronotum fortement imprimé au milieu devant le métanotum chez les "♂", beaucoup moins chez les "♀". Carène du mésonotum courte et faible. Epines fines et aiguës, très divergentes. Disque du pétiole arrondi, pas plus large que le postpétiole. Celui-ci fortement imprimé derrière, parfois faiblement prolongé devant.

Congo belge : Kondue (Luja), reçu de M<sup>r</sup> REICHENSBERGER.

**Crematogaster (Atopogyne) Buchneri** FOR. st. **biimpressa** MAYR. — Cette race varie de 3 à 5.5 mill. Les "♂" sont plus foncées, la base du gastre à peine roussâtre. Les deux impressions occipitales plus ou moins nettes chez certains individus. Le *C. transicus* FOR. me paraît n'être qu'une variété de *biimpressa*.

Congo belge : Kondue (Luja), reçu de M<sup>r</sup> REICHENSBERGER.

**Syllophopsis cryptobia** nov. sp. (Fig. 2, a-b-c.) — ♀ Long. 1.3 mill. Jaune terne pâle, lisse et luisant. Pubescence abondante, courte et oblique. Tête d'un cinquième plus longue que large, le bord postérieur et les côtés assez convexes. Yeux d'une facette, au




Fig. 2. — *Syllophopsis cryptobia*, nov. sp. : a) tête, b) funicule, c) thorax et pédou-cule de profil.

*Syllophopsis Arnoldi*, nov. sp. d) tête, e) profil.

milieu des côtés. Arête frontale très rapprochée. Epistome court, à carène médiane faiblement bifide en arrière. Mandibules à bord terminal assez oblique de 3-4 dents, le scape atteint le bord postérieur de la tête. Dernier article de la massue aussi long que les neuf précédents réunis; les deux autres articles de la massue de