

un peu plus longs que ceux de la tête et également inclinés en avant. Quelques poils courts sur les fémurs antérieurs. Mandibules de 5 dents, lisses à peine striées. Thorax et tête beaucoup plus étroits que chez la var. *amatongae* ARNOLD. Profil du thorax continu, pas ou à peine impressionné au niveau des sutures tandis qu'il y a une impression pro-mésnotale nette chez le type.

Afrique Orientale allemande : Bukoba (VIEHMEYER leg.).

Prenolepis (Nylanderia) subtilis SANTS st. **termitophila**, nov. st. — ♀ Long 1.5 mill. — Jaune brunâtre terne. Mandibules, dos du promésnotum, hanches, tibias, tarsi et écaille d'un jaune pâle. Submat, surtout la tête et le gastre qui sont plus pubescents que le thorax. La pilosité dressée, jaunâtre placée autour de la bouche, le long du front et sur le gastre, forme deux paires sur le pronotum, une sur le mésnotum et l'épinotum. Appendices glabres. Tête ovale, avec un bord postérieur étroit et presque droit. Yeux plus grand que le quart des côtés, un quart plus grand que l'intervalle qui les sépare de l'angle antérieur de la tête. Arêtes frontales convergentes en arrière. Pas de sillon frontal. La fosse antennaire grande atteint presque les yeux. Epistome caréné. Mandibules à bord terminal très oblique armé de cinq dents très petites. Le scape dépasse d'un quart à un tiers le bord postérieur. Article 2 du funicule presque aussi long que large, le 3^{me} plus long que large (plus court chez *subtilis*). Pronotum le double plus large que long, avec les côtés saillants. Mésnotum rectangulaire un peu plus long que large. Face basale de l'épinotum moitié plus courte que le mésnotum et que la face déclive. Ecaille étroite, faiblement élargie vers le sommet qui est un peu arqué. La face antérieure du gastre est plus claire tronquée et même un peu concave.

Cameroun : Duala (v. ROTHKIRCH) dans un nid de termites. Reçu de M. WASMANN. — Diffère de *subtilis* par ses antennes plus graciles et sa tête plus arrondie derrière.