

♀ Long. 8 mm. Noir, bord extrême des tibias, derniers tarsi plus ou moins rouge brunâtre. Mate. Sculpture et pilosité comme chez l'♂. La tête comme chez *C. pusillus* Klug ♀, mais plus nettement carrée, les lobes frontaux un peu plus larges. Les angles postérieurs subdentés. Mésonotum plus triangulaire, ou plus étroit devant. L'épinothum et le pédicule beaucoup plus large. Les côtés de la face basale bordés et bidentés. La déclive également bordée, abrupte et concave de haut en bas. Le premier nœud est environ le double plus large que long, les côtés plus prolongés que chez *pusillus* avec une dent dirigée en arrière et un peu en dehors. Le postpétiole est environ trois fois plus large que long, disposé comme chez l'♂. Gstre très allongé, à côtés parallèles peu échancrés à la base.

Bolivie : Río Guapay (Lizer et Delétang).

### ***Cryptocerus pilosus* Em.**

♀. (Non décrite). Long. 9 mm. Couleur, sculpture et pilosité comme chez le ♂, mais le gstre a en outre quatre taches jaunes. La tête, l'épinothum et le pédoncule plus étroits que chez le ♂, mais avec les mêmes dents. L'aile antérieure brunâtre, les nervures brunes, la supérieure longue de 6 mm. Largeur du corps 1,8 mm.

Argentine : Chaco de Santiago del Estero, Río Dulce (E. R. Wagner). 1 ♀ de la coll. Le Mout.

### ***Cryptocerus pusillus* Klug**

Argentine : Corrientes, San Roque (J. Bosq. leg).

Matto Grosso (Silvestri).

Bolivie, de Bayova à Guagua (Lizer et Delétang).

Paraguay, Asunción Villa Mora (Spégazzini).

### ***Cryptocerus pusillus* Klug v. *brevispinosa* n. var.**

L'ouvrière diffère du type par ses épines latérales du pétiole beaucoup plus courtes, seulement dentiformes, tuberculées, ou même ab-