

## FOURMIS DU CAIRE.

1. **Ponera Ragusai** Em. ♀.
2. **Monomorium bicolor** Em. ♀.
3. **M. Salomonis** L. ♀.
4. **M. gracillimum** Sm. ♀.
5. **Cremastogaster inermis** Mayr ♀.
6. **Pheidole teneriffana** For. ♀ ♀.
7. **Stenamma (Messor) barbarum** L. r. **capitatum** Latr. var. **mediorufa** For.
8. **Prenolepis (Nylanderia) Jaegerskioeldi** Mayr.  
var. **Borcardi**, nov.
9. **Myrmecocystus bicolor** Fabr. ♀ ♀.
10. **Camponotus maculatus** (i. sp.) Fabr. ♂ ♀ ♀.
11. **Camponotus maculatus** r. **thoracicus** F. var. **Xerxes** For.

## FOURMIS DE TUNISIE.

1. **Ponera Ragusai** Em. ♂<sup>1?</sup>
2. **Leptanilla exigua**, n. sp. ♂.
3. **Pheidole teneriffana** For. ♀ ♀.
4. **Ph. pallidula** Nyl. r. **tristis** For. ♂ ♀ ♀.
5. **Stenammia (Aphaenogaster) pallida** Nyl. v. **Leveillei** Em. ♂.
6. **Oxyopomyrmex Emeryi**, n. sp. ♀.
7. **Leptothorax arenarius**, n. sp. ♀ ♀.
8. **Plagiolepis simulans**, n. sp. ♂ ♀ ♀.
9. **Camponotus lateralis** Oliv. var. **crassinodis** For. ♀.

## DESCRIPTION DES ESPÈCES, DES RACES ET DES SEXES INÉDITS.

**Ponera nivariana**, n. sp. — ♀. Long. : 2,3 mill. — Jaune testacé. Mandibules d'un jaune plus clair. Pubescence fine, blanchâtre, peu couchée, assez peu serrée sur l'abdomen, encore moins sur son premier segment, le dos du thorax et les mandibules, où elle laisse mieux voir la sculpture. Quelques fins poils dressés et courts sur les mandibules et l'extrémité de l'abdomen. Quelques longues soies partant du bord antérieur du clypeus. Luisante, surtout dans les endroits où la pubescence est faible. Mandibules lisses, parsemées de quelques