

quées. Chez *Ph. pallidula* i. sp., le 2^e nœud est seulement un peu plus large que long, généralement inerme; quand il y a des épines, elles sont très petites et placées plus en avant vers l'angle antérieur.

♀. Long. : 7,2-9,5 mill. — Couleur comme le ♂. Tête un peu plus claire, avec une tache apicale. Pilosité un peu plus longue que chez *pallidula*. Tête plus grande, stries plus fortes et plus prolongées en




Fig. 5. — *Pheidole pallidula* Nyl. : a, ♀ deuxième nœud du pédicule; b, ♂ deuxième nœud du pédicule; c, ♂ stipe vu de côté. Gr. $\times 25$.

Fig. 6. — *Pheidole pallidula* Nyl. r. *tristis* For. : a, ♀ deuxième nœud du pédicule; b, ♂ deuxième nœud du pédicule; c, ♂ stipe vu de côté. Gr. $\times 25$.

Lisse et luisant. Tête plus large en arrière que chez *pallidula*. Bord terminal des mandibules plus large, avec 4 ou 5 dents moins distinctes. Métanotum plus aplati, épinothum plus large en arrière, 2^e nœud du pédicule plus large. Le stipe (valvule génitale externe) est triangulaire, aussi large à la base que long, recourbé en dedans, et présente près de son extrémité une sorte de dent dirigée en dedans et en arrière, qui manque chez *pallidula* ou est bien moins nettement indiquée.

Commune dans tout le Sahel : Kairouan, Sousse, Gabès, Sbeitla.

J'élève cette forme au rang de race, en raison de la constance de

arrière. Thorax beaucoup plus robuste. Deuxième nœud du pédicule près de 2 fois $1/2$ plus large que long, terminé latéralement par une épine comme chez le ♂. (Chez *pallidula* ♀, le 2^e nœud est à peine deux fois aussi large que long, mutique ou submutique). Ailes hyalines, nervures jaunâtres. Bord postérieur des segments abdominaux jaunâtre, du reste comme *pallidula* i. sp.

♂. Long. : 5-5,5 mill. — Brun noirâtre. Mandibules et antennes jaunes, pattes jaune brunâtre.