

Afrique orientale allemande : Kelima, Kilimandjaro (zone des cultures) (*Ch. Alluaud*, 1904), Muséum de Paris.

Gen. **Tetramorium** Mayr.

Tetramorium setuliferum Em. var. **cucalense**, nov. — ♀. Long. : 4,5-5 mill. — Aussi robuste que la race *galoasanum* Sants., mais la sculpture et la pilosité diffèrent peu du type. La couleur est un peu plus foncée. Les soies couchées du thorax et de l'abdomen sont un peu plus longues, mais aussi espacées que chez le type et d'un blanc d'argent (plutôt dorées chez le type). Les rides longitudinales de la tête sont aussi serrées mais plus irrégulières et moins prononcées que chez le type. La tête plus large est légèrement échancrée en arrière. La face supérieure du nœud du 1^{er} article du pédicule est aussi large que longue et le 2^e article plus de deux fois plus large que long.

Benguela : Cucala près Cacunda (*J. Cruchet*).

T. setuliferum Em. st. **galoasanum** Sants. — La confrontation de cette forme du Congo avec des exemplaires de l'Afrique australe m'oblige à l'élever au rang de sous-espèce. Outre la robustesse, la pilosité est beaucoup plus abondante et surtout plus longue, chaque soie atteignant presque le milieu de la suivante (chez le type elles sont loin de l'atteindre et elles l'atteignent à peine chez la var. *cucalense*). La sculpture en est un peu masquée sur le dos du thorax. Celle-ci est beaucoup plus granuleuse. Les rides du dessus de la tête sont beaucoup plus espacées (plus du double) et laissent compter au moins trois à quatre rangées de ponctuation entre elles, tandis qu'il n'y en a qu'une seule chez le type. La tête, presque aussi large que longue, a ses côtés assez nettement convexes. Les épines épinoles sont dirigées plus en arrière et leur base très large presque foliacée. Le premier nœud est plus long que haut (aussi long que haut chez *setuliferum* i. sp.) et le deuxième nœud bien moins large ainsi que le segment du gastre.

Congo français (*A. Weiss*, *R. P. Zimmermann*).

Tetramorium squaminode, n. sp. — ♀. Long. : 3 mill. D'un noir un peu brunâtre, abdomen noir. Antennes brunes. Mandibules et pattes brun jaunâtre. Pilosité dressée jaunâtre assez abondante sur tout le corps, rare sur les pattes, assez longue sauf sur la tête et les pattes. Antennes et pattes pubescentes. Dessus de la tête et épistome assez grossièrement ridés en long (12 rides environ). Sur les côtés de la tête les rides forment un reticulum lâche qui s'atténue