


avant, et en arrière duquel la face basale de l'épinothum se continue en une surface plane ou légèrement concave, beaucoup plus basse que le promésonothum. Le reste comme chez le type, que je ne connais pas en nature.

Moyen Chari, Fort-Archambault (D^r J. Decorse 1904). Un exemplaire, Muséum de Paris.

Catantolacus egenus, n. sp. — Appartient au groupe *pullus lobatus* Kohli. ♀. Long. : 4 mill. Noir. Scape, 1^{er} article du funicule, tibiais antérieurs jaune rougeâtre, tibiais des deux dernières paires brun rougeâtre. De courtes soies claviformes sur les pattes, les antennes et en bordure sur le devant et les côtés de la tête et du thorax, manquant sur le reste du corps. Quelques rares soies pointues sous le gastre. Pubescence presque nulle. Mat. Tête et pronotum ridés-réticulés avec une sous-sculpture ponctuée entre les mailles. Les rides sont assez espacées, faibles et généralement longitudinales sur la tête (un peu moins accentuées que chez *taprobanae* For. et un peu plus serrées que chez *pullus* Sants.). Les mailles du devant du pronotum sont plus régulièrement polygonales, puis s'allongent en arrière de façon à se transformer en rides régulières longitudinales qui se poursuivent jusque sur la face basale de l'épinothum au milieu de laquelle elles s'effacent, laissant libre la ponctuation assez forte et régulière du fond. Les rides s'effacent aussi un peu vers les angles postérieurs du pronotum, sur l'épinothum elles convergent de tous côtés vers les épines sur lesquelles elles se continuent. Tête, en arrière de la crête occipitale, ponctuée granulée. Épistome plus finement ridé-ponctué que la tête. Mandibules irrégulièrement et fortement ridées en long avec un fond finement rugueux et très mat. Cuisses cannelées en long, ponctuées, mates dans le fond des cannelures. Les deux nœuds du pédicule sont ridés-striés en travers, avec un fond très finement rugueux assez luisant. Gastre densément et régulièrement ponctué comme chez *taprobanae*, mais avec les rides bien plus effacées et visibles seulement vers la base où elles sont plus serrées. Tête un peu plus longue que large, les bords latéraux, en arrière des yeux, forment avec le bord occipital faiblement sinueux un angle droit relevé en une dent unique et à peine saillante. En avant des yeux se trouve une



G. egenus ♀.