

pronotum sont superficiellement réticulés, ridés en long, le reste du côté du pronotum lisse. Pattes et antennes finement ponctuées-réticulées. Abdomen lisse, strié à la base. Tête comme chez *Simoni* Em., bord antérieur de l'épistome un peu moins arqué. Les mandibules sont moins longues que l'intervalle de leur base aux yeux, mais plus longues que chez *Simoni*, finement denticulées. Quatrième article du funicule très peu plus long que le premier, 2^e et 3^e articles seulement un peu plus longs que larges. Thorax fortement étranglé entre le mésonotum et l'épinotum qui sont très convexes sur le profil. Pronotum fortement épaulé, aussi large que long, assez nettement bordé et hexagonal. Les trois bords antérieurs subégaux sont plus petits que les trois postérieurs dont le dernier est un peu échancré en coin pour recevoir le mésonotum. Épines épinotales longues comme les deux tiers de l'intervalle de leur base. Face déclive bordée de deux bandes spongieuses sous les épines. Premier nœud du pédicule plus haut que long, arrondi au sommet, plus étroit en avant. Le pétiole, très allongé, porte en dessous, sur toute sa longueur, une étroite expansion membraneuse, 2^e article en ovale transversal, presque deux fois aussi large que long, aussi long que le précédent : deux fortes expansions spongiiformes pendent au-dessous et entourent en bande mince son bord postérieur.

Diffère de *Lujae* Forel par sa taille plus petite, son pronotum luisant, ses mandibules et antennes plus longues et ses expansions glandulaires ; de *Simoni* Em., par son 4^e article du funicule plus court, son thorax étranglé, les stries de la base du gastre et la sculpture du 2^e article du pédicule.

♀. Long. : 2,6 mill. Couleur de l'ouvrière. Bord dentaire des mandibules, dessus de la tête et dos du thorax un peu plus foncés. Les poils claviformes s'étendent jusque sur la tête. Pronotum fortement épaulé aussi large que le mésonotum. Ailes hyalines, nervures brunes. Premier nœud du pédicule relativement plus large que chez l'ouvrière.

Afrique orientale allemande : grotte de Tanga, dite de Kulumuzi (*Ch. Alluaud*, avril 1909).

Strumigenys serrula Sants. (*S. Lujae* For. var. *serrula* Sants., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1909, p. 390). — Cette forme doit être élevée au rang d'espèce.

♂. Long. : 4,8 mill. Jaune. Poils claviformes très rares sur le thorax, le pédicule et l'arrière abdomen. Pubescence cochléaire dispersée sur la