

tête, le scape, les pattes, plus rare sur le thorax. Réticulée, faiblement ponctuée. Mate. Mandibules lisses peu luisantes; 2^e article du pédicule un peu luisant avec la sculpture assez effacée. Gastre lisse et luisant, pourvu de quelques courtes stries à la base. Tête plus courte que chez *Simoni* Em. Mandibules presque aussi longues que l'espace de leur base à l'œil. Épistome comme chez *Simoni*. Antennes assez courtes. Quatrième article du funicule, à peine aussi long que le premier, long comme le tiers du cinquième. Deuxième et troisième articles plus larges que longs. Thorax bien moins resserré que chez *Alluaudi*, formant sur le profil une ligne convexe interrompue par la dépression du sillon métanotal assez profond. Pronotum nullement épaulé, en losange arrondi non bordé. Suture promésonotale indistincte. Face basale de l'épinotum faiblement convexe en avant. Épines longues comme un peu plus du tiers de l'intervalle de leur base. Face déclive, concave, aussi longue que la face basale et formant avec elle un angle très ouvert. Premier nœud du pédicule arrondi, haut, moins longuement pétiolé que chez *Alluaudi*, inerme en dessous. Deuxième article en ovale transversal, presque deux fois aussi large que long. Appendices membraneux faiblement développés au-dessous du deuxième nœud.

Congo français : Brazzaville (*Weiss*).

Strumigenys cognata, n. sp. — ♀. Long. : 2-2,2 mill. Jaune un peu roussâtre. Mandibules, antennes et pattes plus claires. Segment basal du gastre un peu rembruni au milieu. Pilosité comme chez *Alluaudi*, mais plus claire. Mandibules, une grande partie du dessus du pronotum, côtés du thorax, gastre lisses et luisants (seulement les côtés du pronotum chez *Alluaudi*); 2^e article du pédicule lisse avec un reflet grassex. Tête, dessus du mésonotum et de l'épinotum ponctués-réticulés, reste du pronotum et 1^{er} article du pédicule faiblement ponctués-réticulés et mats. Fond de l'échancrure méso-épinotale, base du gastre nettement ridés. Tête un peu plus courte que chez *Simoni* et plus fortement échancrée. Mandibules et épistome comme chez *Alluaudi*. Le 4^e article du funicule est plus long que le premier, mais pas autant que chez *Simoni* Em. Articles 2 et 3 presque aussi épais que longs. Thorax bordé. Promésonotum moins convexe que chez *Alluaudi*. Le bord antérieur du pronotum un peu arqué en avant avec les épaules avancées (nettement anguleux et les épaules fuyantes en arrière chez *Alluaudi*). Épines un peu plus longues mais bien plus épaisses à la base que chez *Alluaudi*. Face déclive, bordée de deux bandelettes spongieuses. Pédicule et abdomen comme chez *Alluaudi*, mais l'expansion