

reil copulateur en partie roussâtres. Antennes et pattes gris jaunâtre. Sculpture finement ponctuée comme chez la femelle, mais la pubescence est plus discrète. Un peu luisant.

Tête trapézoïdale un peu plus grosse et plus large en arrière que chez *Atlantis*. Ocelles jaunâtres et plus grands. Thorax légèrement plus trapu.

Kairouan. Cette espèce dont j'ai décrit autrefois les mœurs parasitiques, habite la plaine. La femelle ressemble beaucoup à *Atlantis* par sa grande taille, mais en diffère nettement d'autre part, ainsi que l'ouvrière. Celle-ci est entièrement d'un jaune grisâtre, la tête bien moins large chez *Atlantis* que j'ai reçue du Kef. (D<sup>r</sup> Normand.) Je rapporte provisoirement à *meridionalis* Rog. la petite espèce qui se trouve dans les environs de Kairouan, mais il est probable que c'est là aussi une forme différente du type de Roger. Ce groupe mérite une révision que j'espère pouvoir entreprendre dans la suite.

Le *Bothriomyrmex decapitans* est parasite de *Tapinoma nigerrimum*. La femelle féconde pénètre dans le nid de son hôte, se fait accepter par les ouvrières *Tapinoma*, s'approche peu à peu de la reine *Tapinoma*, et finit par la décapiter. Ce sont les ouvrières *Tapinoma*, devenues orphelines, qui soignent le couvain de la femelle parasite ; quand celui-ci éclôt, la fourmilière est mixte, composée d'ouvrières *Bothriomyrmex* (jaunâtres) et *Tapinoma* (noirâtres), mais, peu à peu, celles-ci disparaissent et la colonie *Bothriomyrmex* reste pure (1).

#### **Solenopsis Scipio** n. sp.

Ouvrière. — Long. 1,5 mill. Brun jaunâtre. Pilosité plus épaisse, recourbée, mais bien moins dense que chez *S. fugax*. Lisse, luisante, avec une ponctuation espacée sur la tête.

Tête rectangulaire, plus longue que large, aussi longue en avant qu'en arrière, à côtés légèrement arqués (plus arqués que chez *latro*, moins que chez *fugax*). Bord occipital droit. Yeux à quatre facettes, situés au tiers antérieur des côtés de la tête. Epistome plus avancé que chez *orbula* Em., bicaréné, bidenté, ou bien *épineux* avec une légère trace de denticule en dehors et près de la base des épines. (Chez *fugax*, *orbula*, *latro*, ces denticules sont bien plus accentués.) Articles 3 à 6 du funicule bien plus épais que longs. Après la suture métanotale, l'épinotum se relève en écaille au-dessus du niveau du mésonotum. La face basale de l'épinotum est un peu plus longue que la face déclive et y passe par un angle arrondi et assez effacé. Le premier article du pédicule est aussi long que chez

---

(1) SANTSCHI. — Mœurs parasitiques temporaires des fourmis du genre *Bothriomyrmex*. *Ann. Soc., Ent. de France* 1906, p. 363 à 392.