

des mandibules (parfois entièrement) roussâtres. Antennes et pattes jaunes. Lisse et luisante. Pilosité moins forte que chez *fugax* Latr. Tête plus petite que chez *fugax*, aussi large que longue et aussi large en avant qu'en arrière avec les côtés presque droits et les angles postérieurs plus arrondis que chez *fugax*. Les yeux sont placés presque au milieu des côtés. Epistome un peu plus court, à carènes et dents un peu plus écartées




Fig. 14. — *Solenopsis lou* For.

a, Ouvrière minor, tête vue de face.
b, Ouvrière major, tête vue de face.
c, Ouvrière major, profil du thorax et du pédicèle.




Fig. 15

1, *Solenopsis lou* Forel, antenne du mâle.
2, — *S. lotophaga*, n. sp., antenne du mâle.
3, — *S. fugax*, L., antenne du mâle.
4, — *S. lotophaga*, n. sp., antenne de la femelle.
5, — *S. fugax*, L., antenne de la femelle

que chez *fugax*, mais moins que chez *lou*. Antennes de 11 articles. Le scape atteint le 6^e postérieur de la tête. La massue est plus étroite et plus longue que chez *fugax*. Son 1^{er} article est long comme le tiers environ du suivant (comme la moitié chez *fugax*). Thorax beaucoup plus long, plus bas et moins trapu que chez *fugax*, plus étroit que la tête. Le scutellum très aplati ne surplombe pas en arrière le métanotum. Epinotum très oblique, subbordé, arrondi à l'union de ses deux faces. Premier article du pédicèle plus court et moins haut que chez *fugax*, son pétiole antérieur est relativement plus épais, le bord supérieur du nœud est à peine arrondi transversalement, sans trace d'échancre, 2^e nœud plus large que le précédent. Abdomen fusiforme, bien plus étroit que chez *fugax*.