

plus mousses. Des femelles et des mâles de petite taille (4,5 et 3.5 mill.) se rapportent probablement à cette espèce, mais n'ont pas été pris avec les ouvrières.

*Cremastogaster Auberti* Em. st. *oasium* n. st.

*Ouvrière.* — Long. 4,3-5 mill. Noire, un peu brunâtre. Mandibules, antennes roussâtres. Massue des antennes et cuisses plus sombres. Luisante. Plus lisse que le type. Les joues, mandibules, côtés du thorax et face basale de l'épinotum assez fortement striés ; côtés de l'épistome et fossettes antennaires plus superficiellement. Pilosité comme chez *Auberti* i. sp. Tête bien plus large que longue, à bord postérieur presque droit. Le scape dépasse le bord occipital de la longueur des deux premiers articles du funicule réunis. Le pronotum est bien plus régulièrement arrondi que chez le type, la suture promésotale peu marquée et nullement enfoncée dans une impression comme chez ce type. Carène médiane mousse et droite. Face basale de l'épinotum plus anguleuse que chez le type, les épines plus courtes, plus robustes et un peu moins redressées. Face supérieure du premier nœud du pédicule plus plane. Ensemble de l'insecte beaucoup plus trapu et plus robuste.

Tunisie, Tozeur (M. Aumont, 1909).

*Monomorium Salomonis* L. var. *areniphila* n. var.

*Ouvrière.* — Long. 3 à 3,3 mill. Plus robuste que *Salomonis* i. sp. Thorax, mandibules et pétiole du pédicule rouges. Tête, antennes, pattes et le reste du pédicule rouge-sombre, parfois un peu brunâtre. Gstre noir.

Sculpture un peu plus forte et un peu plus mate que *Salomonis* i. sp. La tête est nettement plus large que chez le type et que chez *venustum* Sm. La suture mésoépinotale très fortement imprimée, presque autant que chez *venustum*, mais l'épinotum est presque aussi haut que le mésotum, la face basale étant plus convexe que chez *salomonis* et passant à la face déclive par un angle plus arrondi.

Tunisie : Gabès (A. Weiss, 1906) ; Kebili (1907) ; Kairouan, Dratamar. — Nidifie de préférence dans le sable tassé.

*Monomorium (Holcomyrme) Santschii* For.

*Mâle* (non encore décrit). — Long. 3 mill. Brun-jaunâtre, tête et dos du thorax plus foncés. Antennes, palpes et pattes jaunâtres. Ailes hyalines, nervures jaunes et tache passant parfois au brun-clair. Lisse, luisant. Quelques longs poils sur l'abdomen, plus rares et plus courts sur le thorax. Pubescence des pattes assez oblique et très redressée sur les onze derniers articles des antennes.