

FORMICIDES DE DIVERSES PROVENANCES

par le D^r **F. Santschi**

I. PÉROU ET ÉQUATEUR

Cryptocerus multispinus EM. st. *inca* n. st. — ♀ Long. 5 à 6.2 mill. — Noir. Sur tout le corps et les pattes de petites soies squamiformes, canelées au milieu, dorées ou plutôt bronzées chez les petits exemplaires, occupent le fond des fossettes plus confluentes que chez le type, surtout sur l'abdomen. Mat, densément et finement réticulé ponctué. Le dessous de l'abdomen présente un espace lisse moins étendu que chez le type. La tête est moins étroite en avant son bord postérieur, moins concave avec les angles postérieurs obtus ou subdentés. Pronotum et mésonotum comme chez le type, mais l'épinothum ne présente qu'une épine latérale, le denticule qui la précède chez le type est absent ou à peine indiqué. Les épines des angles postérieurs de la face basale sont beaucoup plus longues, aussi longues que l'intervalle de leur base (environ comme le tiers chez le type). Les épines latérales du premier nœud sont aussi plus longues, plus fines que chez le type, presque aussi longues que les précédentes. Les épines du deuxième nœud, au contraire, sont légèrement plus courtes. Abdomen plus long et moins échancré en avant, du reste semblable.

Pérou. La Massa.

6 exemplaires au Museum de Paris (D^r RIVET).**Pheidole Cameroni** MAYR.

(= *Ph. monticola* CAMERON). — Equateur : Riobamba ♀ 2. 1902. — Deley 2,679 m. altit., 2. 1905. — Tulcan ♀ 1902. — San Domingo de los Colorados 510 m. ♂. 1903. — (D^r RIVET).

Pheidole Riveti n. sp. — 2. Long. 3.5 mill. — D'un brun de poix foncé. Tête noirâtre, pattes brun jaunâtre, mandibules brun rougeâtre. Pilosité dressée assez abondante surtout sur l'abdomen et les pattes, un peu plus dense et plus courte que chez *Ph. megacephala*. Pubescence médiocre sur le corps, nulle sur l'abdomen. Assez luisant. Tête ridée, striée en long, le fond des stries lisse ou faiblement réticulé avec quelques points espacés. Un faisceau de rides médianes atteint l'occiput en passant entre les bosses occipitales. Un second faisceau partant des arêtes frontales oblique en dehors vers les bosses occipitales auprès desquelles elles s'arrêtent les laissant lisses. Un troisième faisceau contourne en cercle concentrique