

les fossettes antennaires. Entre ce dernier faisceau et les yeux part une quatrième série de rides qui, se dirigeant vers la face externe des bosses occipitales et les côtés de la tête, se replie en boucle pour redescendre sur les yeux et les côtés de la tête. Aire frontale et portion médiane de l'épistome lisse et luisant. Mandibules lisses avec quelques gros points pilifères, striées à leur base et le long du bord externe. Promésotum plus ou moins lisse avec quelques rides transversales en avant et sur les côtés. Face dorsale du mésotum lisse au milieu, cerclée de rides. Les deux faces de l'épinotum striées transversalement et côtés un peu striés en long.

Tête plus longue que large, médiocrement incisée en arrière avec un sillon médian assez profond qui atteint en avant l'aire frontale. Bosses occipitales peu accentuées. Côtés de la tête subparallèles légèrement incurvés dans le quart postérieur. A partir du 1<sup>er</sup> faisceau de rides centrales la tête s'atténue latéralement en pente de toit. Yeux en avant du milieu des côtés de la tête. Aire frontale imprimée, clypeus assez plat en avant, à bord antérieur échancré au milieu. Mandibules armées de deux dents apicales mousses peu distinctes, inermes en arrière. Crêtes frontales peu divergentes, un peu plus longues que chez *megacephala*. Le scape, non coudé à sa base, atteint le bord postérieur de la tête, tous les articles du funicule sont bien plus longs que larges. Pronotum peu anguleux latéralement, mésotum légèrement imprimé en travers dans son tiers antérieur, le tiers postérieur formant un bourrelet qui s'enfonce en avant du métanotum. Incisure métanotale peu accentuée, étroite sur le même plan que la face basale de l'épinotum. Celle-ci un peu plus longue que la face déclive, d'un tiers plus longue que large, assez plane en avant, concave transversalement en arrière. Submutique. Sommet du premier nœud en écaille arrondie. Deuxième nœud plus long que large, un peu plus large en avant qu'en arrière, formant un léger angle mousse de chaque côté.

♂. Long 2, 2 à 2.4 mill. — Couleur et pilosité du ♀. Moitié antérieure de la tête striée. Les stries partent de l'aire frontale, divergent en s'atténuant bientôt en arrière. Un faisceau bien distinct contourne les fossettes antennaires. Le reste de la tête est lisse avec quelques points et quelques stries transversales courtes en arrière. Tiers postérieur du mésotum et épinothum transversalement ridé. Côtés du pédicule réticulé ponctué. Le reste lisse. Luisante. Tête un peu plus longue que large, hémisphérique en arrière des yeux, mandibules armées de deux dents apicales aiguës, suivies de quelques denticules indistincts, tout à fait inerme en arrière. Aire frontale large. Crêtes frontales peu divergentes, le scape dépasse d'un quart l'occiput. Mésotum imprimé. Sa moitié postérieure descend obliquement vers la suture métanotale.