

Epinotum inermis, face basale d'un quart plus longue que la face déclive. Deuxième nœud très plat; plus long que large, ovale.

♀. Long. 5.5 mill. — Noire. Antennes et mandibules brun noir. Pilosité roussâtre abondante. Sculpture de la tête disposée comme chez le π , mais plus forte. Pronotum ridé en travers. Mésonotum lisse avec deux larges bandes de stries convergeant en arrière. Scutellum lisse, épinotum strié en travers, côtés du pédicule ridé rugueux. Dessus des nœuds et gastre lisses. Tête carrée, à peine plus large que longue. Le scape dépasse légèrement le bord postérieur. Epinotum fortement denté, 2^e nœud aussi large que long avec les côtés coniques. Sommet du premier nœud squamiforme, entier. Gastre court, pour le reste comme le soldat. Cette femelle est un peu aberrante par la présence des épines épinotales qui manquent chez le soldat. Mais les autres caractères sont semblables, elle provient de la même localité.

Équateur : El Angel, 3,000 m. d'altit., 2 ♂, 13 ♀, 4 ♀ (Dr RIVET 1903).

Crematogaster brevispina MAYR. st. **Mancocapaci** n. st. — ♀. Long. 3-3.8 mill. — Brun de poix plus ou moins jaunâtre. Moitié postérieure du gastre rembruni. Mandibules rougeâtres. Pilosité dressée aussi longue mais un peu plus rare que chez *Cr. distans*. Pubescence bien espacée que chez *brevispina* i. sp. et bien plus abondante que chez *distans*, très dense et un peu relevée sur les pattes et les antennes. Luisante. Tête lisse avec quelques points pilifères très clairsemés. Le devant de la tête faiblement strié ainsi que la partie antérieure de l'épistome et l'aire frontale. Mandibules striées. Thorax lisse moins la face basale de l'épinotum qui est irrégulièrement striée en long. On voit en outre quelques stries assez fortes sur les côtés du mesonotum plus effacés sur les côtés du pronotum et de l'épinotum. Pédicule et abdomen lisses. Tête plus large que longue et plus étroite en avant qu'en arrière chez les grands exemplaires, aussi plus longue que large avec les côtés plus parallèles chez les petits. Bord postérieur droit avec les angles bien marqués quoique arrondis.

Epistome arrondi en avant avec un bord antérieur droit. Mandibules armées de 4 dents. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Massue de 3 articles, le 3^e du funicule est nettement plus épais que les précédents et plus d'un tiers plus long que large (plus court chez *brevispina*, plus long et plus étroit chez *distans*). Pronotum régulièrement arrondi en avant et de côté, le mésonotum plus long que large (plus long que chez *brevispina*), se rétrécit en arrière et forme avec le pronotum un profil convexe régulier sans dépression médiane ni descente brusque vers la scissure métanotale. C'est à