

peine si le mésonotum se surlève un peu en arrière de la suture antérieure. Epinotum comme chez *brevispina* mais la face basale est moins convexe, presque plane, à peine plus élevée que la scissure métanotale qui est faiblement imprimée. Epine comme chez *brevispina*. Le premier nœud du pédicule présente une face supérieure presque carrée armée de dents aux angles postérieurs et d'une petite épine en avant et en dessous. Deuxième nœud plus large que long avec une très faible impression en avant, beaucoup moins apparente que chez *distans*. Gastre court et peu relevé.

♀. Long. 8.5-9 mill. — D'un noir brunâtre. Antennes, pattes et dessous du gastre d'un brun plus clair. Mandibules rougeâtres. Pilosité plus dense surtout sur le thorax. Pubescence et sculpture comme chez l'ouvrière sauf que la tête est plus fortement striée en avant. Luisante. Tête encore plus large que chez l'ouvrière. L'épinotum est presque vertical au dessous du metanotum, il est armé de deux dents ou épines aussi larges que hautes, dirigées en arrière et placées au tiers supérieur de ses bords. Ailes jaunes ternes à nervures brunâtres. Pédicule robuste. Le premier article a sa face supérieure plus étroite en avant avec des angles postérieurs subdentés. Le deuxième nœud aussi long que large sans impression médiane. Gastre cylindrique plus long que le reste de l'insecte.

♂. Long. 3.6 mill. — Noir. Epistome, mandibules, antennes et pattes un peu brunâtres. Pilosité plus riche que chez la ♀ et plus longue que le gastre. Pubescence plus faible. Lisse sauf quelques rides longitudinales entre les yeux et les fossettes antennaires sur le devant de l'épistome et transversalement sur l'occiput, le devant du pronotum et les côtés du thorax. Mandibules faiblement striées. Tête triangulaire aux angles arrondis. Yeux un peu plus grands que la distance qui les sépare des ocelles latérales. La distance qui sépare celles-ci de la médiane est comme le double de leur diamètre. Mandibules de trois dents. Epinotum inerme convexe. Premier nœud du pédicule long et brièvement petiolé en avant avec les angles mousses.

Equateur : Chillacocha (3900 m. d'alt.) 28 ♀♀, 17 ♀♀, 1 ♂ (D^r RIVET 1905).

II. MADAGASCAR ET COTE D'IVOIRE

Cremastogaster gabonensis Em. — ♂ (non décrit) Long. 2.8-3 mill. — Noir. Mandibules, antennes et tarsi testacés. Luisant lisse. De fines stries sur les côtés de l'épinotum et de la metapleur. Pilosité médiocre, plus dense sur l'épinotum. Tête petite, trapézoïdale aussi longue que large (avec les yeux) le bord occipital transversal étroit comme la moitié de la largeur du devant de la tête.