

Yeux très convexes occupant presque la moitié antérieure des cotes. Epistome convexe à bord antérieur arqué. Mandibules lisses quadridentées. Scape long comme le 3<sup>e</sup> article du funicule. Thorax moins d'un quart plus long que haut, très bombé en avant ensellé au milieu du dos. Les deux faces de l'épinotum forment une courbe très peu anguleuse à leur union. Pédicule comme chez l'ouvrière mais le premier article est de moitié plus court, le 2<sup>e</sup> sans sillon.

Côte d'Ivoire (J. H. LOHIER 1911.) Reçu avec de nombreuses ouvrières.

**Cr. striatula** EM. — Nombreuses et même provenance que l'espèce précédente.

**Dorylus Gribodoi** EM. ♂. — Côte d'Ivoire J. H. LOHIER.

**Sima demens** n. sp. — ♀ Long. 4,8 mill. — Voisine de *Sahlbergi* FOR., et de *hysterica* FOR. Noire. joues et mandibules rouges. Scape, moitié basale des funicules, articulations des pattes et tarsi testacés. Reste des funicules et des pattes brun noirâtre. Assez luisante, devant de la tête submat. Lisse avec une très fine ponctuation dispersée partout. Joues couvertes de petites fossettes allongées irrégulières et assez denses. Mandibules ridées striées. Espace entre les crêtes frontales finement strié en long. Pubescence plus forte que chez *Sahlbergi*. Pilosité blanchâtre, plus forte que chez *Sahlbergi*, moins que chez *hysterica* et *rakotonis* FOR. Tête environ un tiers plus longue que large, un peu arrondie en arrière, un peu plus large en arrière, les cotés étant légèrement concaves en avant des yeux et plutôt convexes en arrière. Pas d'ocelles mais un sillon médian s'arrêtant en arrière à l'emplacement de l'ocelle antérieur. Yeux au milieu des côtés de la tête, un peu moins plats que chez *Sahlbergi* mais beaucoup plus que chez *rakotonis*. Epistome bi-échancré, la partie médiane formant une forte dent, atteignant le bord antérieur. Mandibules de 4 à 5 dents; le bord terminal plus long que le bord interne, le bord externe assez convexe avec l'angle basal arrondi mais non coudé. Le scape atteint le bord postérieur des yeux. Articles 3 à 6 du funicule plus épais que long. Thorax à peine subbordé, beaucoup moins que chez *hysterica*. Pronotum aussi large que long à peine rétréci en arrière, faiblement convexe sur le profil comme chez *Sahlbergi*. Mesonotum plus élevé, plus large que long, limité par des sutures arquées bien marquées, la promesonotale assez enfoncée dans un sillon. Metanotum deux fois aussi large que long avec les angles prolongés. Son plan est un peu plus haut que celui de la face basale de l'épinotum dont il est séparé par un fort sillon. (Chez