

Sahlbergi l'épinotum est plus élevé que le métanotum.) La face basale passe à la déclive par une courbe accentuée, elle est longue comme les deux tiers de cette dernière. Le 1^{er} nœud du pédicule est un peu plus globuleux et relativement plus court que chez *Sahlbergi*, sa face antérieure sans troncature. Son pétiole antérieur court comme la moitié du nœud avec une petite dent oblique au milieu de son bord inférieur. Deuxième nœud un peu plus long que large.

Madagascar : Andridana, banc d'Ampasiondæra (D^r JOLY 1900), Museum de Paris. — Un exemplaire.

Camponotus maculatus FAB. st. **legionarium** n. st. — ♀ major. Long. 15 mill. — Aspect de la race *Xerxes* FOR. et *thoracicus* FAB. avec la couleur du premier dont il diffère comme suit : La sculpture du thorax est plus fine et moins mate, de même que pour les scapes et les pattes. La pilosité formée de soie roussâtre est beaucoup plus abondante surtout sur l'abdomen. On voit quelques poils courts sur les joues. Le bord interne des tibias n'a que de courtes soies, mais pas de vrais piquants. Les mandibules sont un peu plus densément striées près de leur bord terminal, l'aire frontale luisante, beaucoup plus étroite que prolongée en arrière (mate et très large chez *Xerxes*) thorax plus court et plus trapu (comme chez *thoracicus*).

Métanotum indistinct. Les deux faces de l'épinotum forment un angle très arrondi presque effacé, l'écaille est plus épaisse à la base et plus courte, roussâtre, du reste semblable. Tête large de 4 mill., longue (sans les mandibules) de 4.5 mill. Longueur du scape 4 mill. d'un tibias postérieur 5 mill.

Madagascar : Diègo Suarez. (Légion étrangère 1903). — Un exemplaire au Museum de Paris.

III. — BARBARIES ET CANARIES.

Aphaenogaster testaceopilosa LUC. v. **depilis** n. var. — Taille et aspects de la var. *canescens* EM. Noire, mandibules, antennes et pattes brunes. Quelques poils courts et fins sous la tête, sous le gastre et sur les hanches, le reste presque entièrement glabre. Mate. Mandibules, funicule et pattes luisantes. Sculpture du thorax finement ponctuée, presque sans rides, plus fine sur la tête que chez *testaceopilosa* i. sp., épines comme chez le type du reste semblable.

Algérie : Ouled-Messelem (P. LESNE 1893). Museum de Paris.