

A. sardoa MAYR. — ♂ (non décrits). Long. 5,5-6 mill. — Brun jaunâtre. Tête et dessus du thorax plus obscurs. Mandibules, tibias et tarsi jaunâtres. Lisse et luisante sauf la tête et le dos du mésosotum qui sont ponctués et mats. Pubescence nulle, pilosité dressée fine discrète formant une légère touffe sur l'angle de l'épinotum. Tête arrondie (sans les yeux qui sont énormes et occupent la moitié antérieure de ses côtés). Promesonotum à peu près comme chez *testaceopilosa*, l'épinotum très allongé, la face basale plane, plus de deux fois plus longue que la face déclive formant avec elle un angle mousse. 1^{re} article du pédicule subcylindrique avec un nœud peu distinct. 2^{me} article d'un tiers plus court presque aussi large que long.

Tunisie : Maktâr, Kairouan, Djbel Ouselet. M. EMERY dans ses *Paläarktische Formiciden* 1908, décrit et figure un ♂ de *A. testaceopilosa gemella* v. *marocana* qui correspond en tout point au ♂ de *A. sardoa*.

A. gibbosa LATR. v. **mauritania** EM. — ♂ (non décrit) long. 4,5-5 mill. — Noir, mandibules, antennes et pattes brunes, lisse et luisant, tête mate et ponctuée. Epinotum un peu plus étranglé en avant que chez le type, du reste semblable.

Tunisie : Djbel Ouselet. Trouvé dans le nid avec les ♀♀, 1907.

A. crocea ANDR. v. **lenis** n. var. — Long. 3 mill. — Thorax et pattes jaunes. Têtes, mandibules et antennes d'un jaune plus roussâtre, gastre jaune terne, avec une bande transversale floue un peu brunâtre. Pubescence médiocre plus dense sur les scapes que sur les pattes. Pilosité dressée setiforme comme chez *crocea splendidoides*. Luisante. Epinotum et cotés du thorax assez mats. Tête lisse avec un réticulum très effacé sur les cotés et le devant. Métanotum et épinotum ridés réticulés. Têtes plus étroite que chez *crocea splendidoides*, un peu plus arrondie en arrière. Suture promesonotale assez imprimée, épines épinotales réduites à de simples spicules. Pour le reste comme chez *splendidoides*. Diffère de la race sicula par la forme étroite de la tête et les épines et du type par sa sculpture.

Tunisie : Le Kef (D^r NORMAND 1911).

A. hesperia n. sp. = *A. crocea* v. *splendidoides* SANTSCHI (Ann. Soc. Ent. France, 1908, p. 517). — Long. 4,8 mill. — Jaunâtre. Mandibules, front et antennes jaune roussâtre. Gastre jaune brunâtre. Pubescence médiocre, courte et dressée sur la tête et les scapes, rare sur le corps, plus longue, oblique et passant à la pilosité sur les pattes. Pilosité dressée plus pauvre que chez *A. pallida* mais