

fine et pointue comme chez cette espèce. Tête et thorax submat. Pronotum, pédicule et gastre luisants et lisses. Tête et reste du thorax très superficiellement réticulé. Quelques rides écartées et basses longent les joues, les côtés de la tête et les côtés de l'épinotum; elles sont transversales sur les deux faces de ce segment. Tête plus longue que large (bien plus longue que chez *pallida*) distinctement plus étroite en avant. Bords postérieurs et latéraux à peine arqués. Angles postérieurs arrondis mais distincts. Les yeux comme chez *pallida*. Mandibules striées ponctuées. Epistome faiblement convexe en avant avec un bord antérieur échancré. Aire frontale large, un peu striée. Le scape dépasse d'un bon cinquième le bord occipital. Les articles médians du funicule sont environ deux fois aussi long qu'épais. Profil du promesonotum moins convexe que chez *pallida*, le mesonotum à peine anguleux au milieu. Face basale de l'épinotum faiblement relevée en avant, large comme une fois et demi la longueur de la face déclive. Epines courtes, large à leur base et légèrement relevées. Premier article du pédicule un peu plus long que chez *pallida* avec un nœud aussi haut que le suivant, celui-ci a un sommet assez arrondi aussi long que large. Cette forme est assez voisine de *pallida*, elle en diffère surtout par la forme de la tête et les antennes.

Teneriffe : Bajamar (Cabreva y Diaz, 1905), 2 ♀♀ dans ma collection.

Leptothorax tenuispinus n. sp. — ♀. Long. 3.3 mill. — Jaune. Bord terminal des mandibules, ocelles et insertion claires brunâtre. Luisante. Lisse. Mandibules striées, devant de l'épistome et côtés de la tête lâchement ridés. Pubescence médiocre sur le corps, assez dense sur les antennes et les pattes. Pilosité assez forte, longue et pointue (comme chez *arenarius* SANTS.). Tête rectangulaire d'un cinquième plus longue que large, bord occipital un peu convexe, aux angles postérieurs arrondis et aux bords latéraux subparallèles. Les yeux occupent le tiers médian des côtés de la tête. Arêtes frontales assez écartées. Aire frontale peu distincte. Epistome convexe à bord antérieur arqué. Antennes de 12 articles. Le scape atteint le bord occipital. Articles 3 à 8 du funicule aussi épais que longs, les autres plus longs qu'épais. Mandibules de 5 dents, l'apicale très forte. Thorax long comme deux fois sa hauteur. Ailes hyalines à nervures et tache jaune pâle. Face basale de l'épinotum convexe non bordée, aussi longue que large et aussi longue que la face déclive, assez peu inclinée en arrière, armée de deux épines extrêmement grêles, aussi étroites à la base qu'au sommet. Redressées et un peu incurvées en arrière et aussi longues que la face déclive de l'épinotum. Celle-ci un peu concave de haut en bas.