

- large, pas d'impression mésoépinotale. Long. 2,2 mill.
 — Natal..... **transversa**, n. sp.
- Plus luisante, tête bien plus courte, une impression mésoépinotale. Jaune clair. — Tunisie.....
 *membranifera* Em. var. *Santschii* For.
- C) 1. Pas de corps spongieux. Long. 2,2-2,5. — Zambèzie...
 *Lujae* For.
- Un corps spongieux..... 2.
2. Corps spongieux faiblement développé sous le 1^{er} nœud, articles 2 et 3 du funicule plus courts que larges, jaune pâle. Long. 1,8. — Congo français..... *serrula* Santschi.
- Corps spongieux développé sous les 2 articles du pédicule. 3.
3. Profil du thorax à peine interrompu, mésonotum presque droit. — Tunisie.....
 *Baudueri* Em. var. *Normandi* Santschi.
- Thorax distinctement imprimé sur le profil, mésonotum plus ou moins convexe..... 4.
4. Base du gastre sans stries. Long. 1,7 mill. — Cap de B.-Esp..... *Simoni* Em.
- Base du gastre strié..... 5.
5. Stries de la base du gastre très fines et serrées, environ 40, les nœuds luisants et lisses.. — Érythée. *Escherichi* For.
- Stries de la base du gastre moins nombreux (20 environ) 1^{er} article du pédicule toujours plus ou moins réticulé et mat ou presque mat..... 6.
6. Les deux nœuds du pédicule réticulés. Long. 2 mill. — Afr. orient. anglaise..... *Alluaudi* Santschi.
- 1^{er} nœud réticulé, le 2^e nœud du pédicule lisse..... 7.
7. *a* Brun foncé, gastre noir brunâtre, pattes brun jaunâtre; épinothum plus convexe, dos du pronotum luisant, pédicule longuement pétiolé. ♂ Long. 1,7. — ♀ Long. 2 mill. — Afr. orient. angl..... **biconvexa**, n. sp.
- b* Jaune roussâtre, épinothum moins convexe surtout en arrière, pronotum luisant ♂ Long. 2 mill., ♀ long. 2,5 mill. — Benguela..... *cognata* Santschi.
- c* Comme *cognata*, mais le pronotum réticulé-ponctué et