

[June 1870]



STUDI MIRMECOLOGICI Date from
Bolton

PER

CARLO EMERY.

***Camponotus* Mayr.**

***C. sylvaticus* Ol.**

È stato trovato in abbondanza dall'egregio Sig. Dott. Professore Alessandro Spagnolini nei boschi di Pini dell'isola di Prin- kipo, sulla costa di Bitinia (Asia minore).

***C. micans* Nyl.**

Nell'anno scorso ebbi dall'egregio Sig. Barone von Rottenberg alcune operarie da lui raccolte presso Catania. Trovasi ancora in Calabria (Prof. Costa).

***C. lateralis* Ol.**

Questa formica, il cui abitato è assai esteso, va soggetta a numerose variazioni, non solo nella colorazione, ma anche nella forma del metanoto. Una di queste varietà fu da me descritta sotto il nome di *C. ebeninus* (Enum. d. Formicidi d. Napoli p. 2); ma poco dopo averla pubblicata dovetti riconoscere la sua quasi perfetta identità col *C. foveolatus* Mayr. varietà del *lateralis*, avendola paragonata con esemplari tipici gentilmente inviati dall'autore. Numerosi individui ricevuti da diverse contrade mi hanno mostrato una serie di forme di transizione, dal metatorace angoloso del *C. ebe-*