

ninus a quello più ritondato del tipico *lateralis*. Intanto nelle vicinanze di Napoli non ho finora trovato che individui appartenenti ai due tipi estremi.

***Lasius* Fab.**

***L. brunneus* Latr.**

In un esemplare ♂ proveniente dall'isola Prinkipo (Bitinia) ebbi da notare la linea frontale meno prolungata che negli individui dell'Europa occidentale, non giungendo fino all'ocello impare.

***L. fumatus* mihi.**

Sostituisco questo nome a quello di *lasioides* (C. Em. Enum. d. Form. p. 6, *Prenolepis*) il quale non può essere conservato.

***Bothriomyrmex* C. Em.**

(Annuario del Museo Zoologico della R. Università di Napoli. Anno V p. 117.)

FOEMINA. Caput elongatum, antrorsum angustatum. Mandibulae trigonae, sexdenticulatae. Clypeus latus, antice bisinuatus, medio convexus, lateribus depressus, foveam antennalem antice limitans. Area frontalis magna, triangularis, distincte circumscripta. Linea frontalis indistincta. Laminae frontales brevissimae, distantes, in margines fovearum antennalium postice transeunt. Foveae antennales magnae et profundae, cum clypealibus confluentes, ab insertionibus antennarum ad margines internos oculorum, et a margine clypei postico ad lineam quae per margines posticos oculorum duceretur extensae. Antennae 12-articulatae, longae et validae capite thoraceque longiores, articulis flagelli, exceptis duobus primis et ultimo, subquadratis vel leviter transversis. Oculi ad latera capitis parum ante medium. Ocelli minuti distantes. Thorax latiusculus, metanoto postice clivo subplano limitato. Petiolus squama erecta, superne subtiliore et angustiore. Alae anticae ut in genere *Solenopsi* area discoidali et cubitali una; costa cubitalis proxime ad aream discoidalem divisa, ramo ejus externo cum costa transversa conjuncto.