

insetto descritto dal Gerstäcker col nome di *Dichthadia glaberrima*. Analoghi ancora sarebbero gl'individui osservati dal Huber nei nidi del *Polyergus rufescens* (Fourmis indigènes, 2<sup>e</sup> édition. Genève 1861 p. 225, tab. II fig. 1) i quali secondo quest'autore dovrebbero considerarsi come tipi di passaggio tra le femmine e le operarie.

Questa specie è stata raccolta sotto le pietre nelle montagne presso Corte in Corsica dal Sig. E. Revelière di Porto Vecchio. Son lieto dedicarla a questo distintissimo entomologo, cui la scienza deve tante scoperte interessanti.

### ***Leptothorax* Mayr.**

***L. melanocephalus* n. sp.**

♀ *L. corticalis* affinis, at statura robustiore, spinis metanoti paulo brevioribus et clava antennarum fusca distincta.

Rufa, opaca, clavato-setulosa, capite (exceptis mandibulis) et antennarum clava fusco-nigris. Clypeus longitudinaliter striatus, medio leviter carinatus. Frons linea longitudinali media laevi, nitida. Thorax inter mesonotum et metanotum haud impressus, spinulis metanoti brevissimis, dentiformibus, intervallo basium brevioribus. Nodi crassiusculi. Abdomen nitidum, sordide rufescens, segmento primo margine magis minusve leviter fumato. Pedes rufi. Long.  $2 \frac{1}{2}$  —  $3 \frac{1}{2}$  mm.

Questa specie è stata rinvenuta sul monte Asinao in Corsica dall'egregio Sig. E. Revelière. Si differenzia dall'affine *L. corticalis* per la statura robusta e per la colorazione nera del capo e delle clave delle antenne, restando tuttora l'addome e i piedi di color rosso chiaro; dalle altre specie si riconosce facilmente per la brevità delle spine metatoraciche.

***L. flavicornis* n. sp.**

♀ Flava, abdominis segmento primo apice late infuscato. Corpus setulis subclavatis, erectis; scapi et pedes pilis adpressis. Caput longitudinaliter rugosum, subopacum. Clypeus longitudinaliter ru-