

ut in *T. caespitum*, spinis metanoti parum longioribus. Nodi vix latiores quam in *T. caespitum* Long. 2 — 2 $\frac{1}{2}$ mm.

♀ *T. caespitum* minor et latior, subtilius rugosa et *nodis petiolaribus latissimis* valde diversa.

Fusco-rufescens, parce pilosa, vertice, metanoto, nodis, femoribusque magis minusve infuscatis, mandibulis apice et abdomine supra nigricantibus. Caput ut in operaria, at brevius latiusque, occipite minus distincte transverse rugoso, magis reticulato. Thorax mesonoto subtilius quam in *T. caespitum* striato, metanoto dentibus longioribus, spiniformibus armato. Petiolus abdominis nodis subtiliter coriaceis; articulus primus antice breviter cylindricus, postice fert nodum transversum, intervallo spinarum metanoti vix latiore, antice excavatum, supra truncatum vel leviter arcuatum; articulus secundus nodiformis, seu potius squamiformis, crassus, altero tertia parte fere latior, supra truncatus. Abdomen nitidum. Long, 4 $\frac{1}{2}$ — 5 mm. Alae ignorantur.

Debbo questa specie all'egregio Sig. Revelière, il quale ne ha raccolte 3 ♀ e parecchie ♂ presso Bonifacio e Porto Vecchio nella Corsica; una ♀ presa nelle vicinanze di Napoli trovasi nella collezione del chiarissimo Prof. Costa.

Le ♂ difficilmente si possono distinguere da quelle del *T. caespitum*, se non per la rugosità trasversa dell'occipite; la lunghezza maggiore dei denti del metanoto non è un buon carattere, perocchè essa è assai variabile nel *T. caespitum*, ed in una varietà di quest'ultimo proveniente dalla Spagna e comunicatami dal Signor Ferris le spine non sono più corte di quelle del nostro *T. meridionale*. La ♀ si riconosce agevolmente per i larghissimi nodi del picciuolo.

***Macromischa* Rog.**

M. Rottenbergii n. sp.

♂ Fusco-nigra, subopaca, abdomine nitido, mandibulis, articulationibus pedum, tarsisque rufescentibus; caput, thorax et petio-