

var. *foveolatus*, Mayr.

Serravalle-Scrvia (*Ferrari*), Voltri (*Doria*); ♀.

11. *Colobopsis truncata* Spinola.

Svizzera, Piemonte, Napoli (*Emery*); ♂♂.

12. *Acantholepis Frauenfeldi* Mayr (1).

Persia settent. (*Doria*); ♀.

var. di color nero: Isola di Capri (*Emery*); ♀♀ ♂.

Il ♂ non è stato ancora descritto.

♂. *Nitidus, fere nudus, niger, mandibulis femoribusque piceis, antennarum flagello, tibiis tarsisque pallidis, squama depressa, antice truncata, medio leviter impressa.* — Long. 2.5 millim. — *Alae cinereo-rufescentes, costis brunneis.*

Rassomiglia molto al ♂ dell'*A. capensis*, da cui differisce principalmente per la squama più grande, più spianata superiormente, distintamente impressa verso il suo margine anteriore.

Gli individui alati sono stati raccolti a Capri nel Luglio 1876. La specie è ivi comune e vive nelle fessure delle rocce vicino al mare.

13. *Plagiolepis pygmaea* Latr.

Piemonte (*Ghiliani*), Stazzano (*Ferrari*), Busalla, Sardegna (*Gestro*), Bona (*Sichel*); ♀♀ ♂.

14. *Prenolepis longicornis* Latr.

Parigi, Stufe del Jardin des plantes (*Emery*); ♀.

(1) Molto affine a questa specie e forse soltanto razza deserticola della stessa è l'*A. bipartita* Smith (Proc. Lin. Soc. 1861, 33). L'♀ differisce da quella dell'*A. Frauenfeldi* per la statura più grande (2.8—3 mill.), la scultura in generale un po' più forte del torace, il quale perciò è meno lucente, il metanoto più largo con le spine più distanti fra loro e la squama più larga in basso, ristretta in su, con l'incisura più angusta.

Palestina (*Smith*); i miei esemplari sono stati raccolti a Biskra in Algeria dal mio amico sig. R. Oberthur; essi sono un po' più scuri di quelli descritti da Smith, di colore ferrugineo scuro, col capo picco, i femori talvolta imbruniti nel mezzo e l'addome nero.