

15. **Brachymyrmex Heeri** Forel.

Zurigo, Stufe dell'orto botanico (*Emery*); ♂♂.

16. **Lasius fuliginosus** Latr.

Svizzera (*Sichel*), Piemonte, M. Viso (*Ghiliani*), Stazzano, Serravalle-Scivia (*Ferrari*); ♂♀.

17. **L. niger** L.

Piemonte (*Ghiliani*), Torino (*Fea*), Montpellier (*Sichel*); ♂♀♂.

18. **L. alienus** Foerst.

Lombardia, Esino (*Gestro*), Piemonte (*Ghiliani*), Stazzano, Serravalle-Scivia (*Ferrari*), Busalla (*Doria*), Culagna (*Kerim*), Sardegna, Tacquisara (*Gestro*), Persia settent. (*Doria*); ♂♀♂.

Le ♀ sono di due forme, differenti fra loro per la grandezza delle ali, le quali nelle une misurano 12 millim., nelle altre appena 7 millim., mentre lo sviluppo del corpo è eguale in tutte.

19. **L. emarginatus** Latr.

Piemonte (*Ghiliani*), Casale (*Negrì*), Voltri (*Doria*), Serravalle-Scivia (*Ferrari*); Vallombrosa (*Kerim*), Monte Nuovo in Sardegna (*Gestro*); ♂♀.

20. **L. brunneus** Latr.

Stazzano (*Ferrari*); ♂.

21. **L. flavus** L.

Alpi svizzere, Piemonte (*Ghiliani*), Graglia (*Doria*), Stazzano (*Ferrari*), Valdobbia, Culagna (*Kerim*), Livorno, Oristano (*Gestro*); ♂♂.

22. **L. umbratus** Nyl.

Alpi svizzere, Alpi marittime (*Ghiliani*); ♂♀♂.

23. **L. mixtus** Nyl.

Losanna (*Emery*); ♂♀♂.