



58. **L. interruptus** Schenk.Pirenei (*Emery*); ♀.59. **L. affinis** Mayr.Zurigo (*Emery*); ♀.60. **L. clypeatus** Mayr.Corsica (*Emery*); ♀.61. **L. angustulus** Nyl.Napoli (*Emery*); ♀.62. **L. Rottenbergi** Em. (1).Capua, Catania (*Emery*); ♀.63. **Asemorhoptrum lippulum** Nyl.Culagna (*Kerim*), Losanna (*Emery*); ♀.64. **Tetramorium caespitum** L.Engadina (*Sichel*), Piemonte (*Ghiliani*), Voltri (*Doria*), Cu-

(1) Ho descritto questa specie sotto il nome generico di *Macromischa*, ma essa è un vero *Leptothorax*, ben distinto però da tutti i congeneri pel colore nero e pel primo nodo del picciuolo quasi emisferico, non angoloso in sopra.

A questa specie si avvicina la seguente:

**L. nigrita** n. sp.

♀. *Nigerrima, trochanteribus, genubus tarsisque picels, capite nitido, antice subtiliter strigoso, haud rugoso antennis 12-articulatis, thorace inter mesonotum et metanotum impresso, ruguloso, spinis obliquis validis, superficie metanoti basali dimidio brevioribus, petioli segmento primo antice concavo, nodo haud globoso, obtuse angulato.* Long. 2,5—2,7 millim.

**Leptothorax**

Rottenbergi.

nigrita.

angustulus.

Due esemplari sono stati raccolti a Lambéssa, in Algeria, dal mio egregio amico sig. R. Oberthur. Si distingue dal *L. Rottenbergi* pel 1.° nodo del picciuolo non globoso, dal *L. angustulus* per la superficie anteriore di questo segmento evidentemente concava.