

lagna (*Kerim*), Sardegna (*Gestro*), Tunisia (*Kerim*), Persia settent. (*Doria*); ♀♀.

var. di colore testaceo.

Culagna (*Kerim*); ♀.

65. **T. meridionale** Em.

Genova (*Ferrari*), Capua (*Emery*); ♀♀.

66. **Strongylognathus testaceus** Schenk.

Lione (*Sichel*); ♀♀ ♂.

67. **S. Huberi** Forel (1).

Fully nel Cant. Vallese (*Emery*); ♀. Esemplare tipico di Forel.

68. **Myrmica rubida** Latr.

M. Codeno (*Gestro*), Alpi svizzere e Alpi marittime (*Ghilianì*); ♀♀ ♂.

69. **M. laevinodis** Nyl.

Alpi svizzere, M. Viso (*Ghilianì*), Stazzano (*Ferrari*), Gressoney, Vallombrosa (*Doria*); ♀♂.

70. **M. ruginodis** Nyl.

Parigi (*Sichel*), M. Codeno (*Gestro*), Serravalle-Scrvia (*Ferrari*), Culagna (*Kerim*); ♀♀.

71. **M. sulcinodis** Nyl.

M. Viso (*Ghilianì*); ♀.

72. **M. scabrinodis** Nyl.

M. Viso, Torino (*Ghilianì*), Gressoney, Graglia (*Doria*), Stazzano (*Ferrari*), Toscana (*Kerim*), Persia settent. (*Doria*); ♀♀ ♂.

(1) Questa specie interessante trovata una volta sola dal Forel nella località indicata è stata rinvenuta ancora nei Pirenei dal signor Puton.